Jurnal Ilmu Bedah Indonesia

Indonesian Journal of Surgery

Official Journal of Indonesian Surgeons Association (IKABI)

Jurnal Ilmu Bedah Indonesia

Indonesian Journal of Surgery

Official Journal of Indonesian Surgeons Association (IKABI)

Editors

dr. Patrianef, SpB(K)V

Departemen Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
RS dr Cipto Mangunkusumo, Jakarta

Dr. dr. Ibrahim Labeda, SpB.KBD

Departemen Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar

Dr. dr. Prihartono, SpB (K) Onk, M.Kes

Departemen Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar

dr. Galih Wilatikta

Departemen Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
RS dr Cipto Mangunkusumo, Jakarta

Staff Redaksi

Sdri. Tiwi

Alamat Redaksi

Jurnal Ilmu Bedah Indonesia (JIBI)

d/a Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia (IKABI) Rukan Mitra Matraman Blok A1 No 18 –
Lantai 2 Jl. Matraman Raya 148, Jakarta Timur, Indonesia. e-mail: jurnalilmubedahindonesia@yahoo.com

Jurnal Ilmu Bedah Indonesia

Jurnal Ilmu Bedah Indonesia (JIBI) sebelumnya disebut Ropanasuri (Bahasa Sansekerta, berarti pisau bedah atau *the healing knife*) yang diperkenalkan oleh Prof dr Moenadjat Wiratmadja merupakan publikasi resmi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia (IKABI) yang terbit pertama kali pada tahun 1968.

Pada perkembangan berikutnya (tahun 2001), sejalan dengan perubahan paradigma di bidang ilmiah, jurnal ini selanjutnya disebut Jurnal Ilmu Bedah Indonesia dan terakreditasi A berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (SK No. 39/DIKTI/Kep/2004).

Jurnal Ilmu Bedah Indonesia (JIBI) diterbitkan oleh IKABI dengan ISSN No. 0216-0951 merupakan publikasi karya ilmiah di bidang bedah yang mencakup epidemiologi, klinik maupun pengetahuan dasar baik menyangkut kelainan kongenital, trauma, infeksi, tumor dan kelainan degeneratif yang ditujukan bagi para dokter spesialis bedah di Indonesia.

Jurnal ini diterbitkan oleh IKABI dua kali dalam satu tahun dalam bentuk cetakan yang dapat diakses dan diunduh dari situs web IKABI. Permintaan berlangganan dapat dikirimkan ke alamat sekretariat redaksi. Advertensi yang dapat dimuat pada jurnal ini hanya advertensi yang berhubungan dengan bidang medik khususnya bedah maupun bidang sains. Untuk pemuatan advertensi di dalam jurnal ini, dapat menghubungi sekretariat redaksi Jurnal Ilmu Bedah Indonesia (JIBI). Petunjuk bagi penulis beserta persyaratan pemuatan tulisan dapat dilihat pada halaman belakang jurnal ini, atau di situs web IKABI.

Jurnal Ilmu Bedah Indonesia

Indonesian Journal of Surgery

Editorial

1	Patrianef Darwis	Wabah COVID-19 Tahun 2021

Author

Article Title

3	Kiki Budiani
Maman Abdurahman
Kiki A Rizki	Hubungan Antara Perubahan Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan Respon Kemoterapi Neoadjuvan Kombinasi Doksorubisin pada Penderita Kanker Payudara Lanjut Lokal di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung
22	Syahmardani Ibnu
Ferry Erdani
Jufriady Ismy	Perbandingan Efektivitas Pemberian Erythromycin dan Metoclopramide sebagai Prokinetik Pasca Operasi Laparotomi Digestif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
32	Eldy Muhammad Noor
M Zafrullah Arifin
Agung Budi Sutiyono	Gambaran Kualitas Hidup Pasien Pasca Trauma Kepala Sedang dan Berat dengan Lesi Intrakranial Menggunakan Parameter EUROQOL Group EQ-5D-5L di Departemen Bedah Saraf Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung

Jurnal Ilmu Bedah Indonesia

Indonesian Journal of Surgery

Author

Article Title

49	Ahmad Iffa Maududy
Kiki Ahmad Rizki
Raden Yohana
Nadjwa Jamalek	Role of Autologous Fibrine Glue to Decrease Seroma Volume On 14th Post Operative Day in Carcinoma Mamae Patients that Underwent Simple Mastectomy
68	Patrianef Darwis
Faisal Ali Ahmad Kler
Karina
Rizky Saputra Telaumbanua	Evaluasi Spektrum Gelombang USG Doppler dan Kaitannya dengan <i>Ankle Brachial Index</i> (ABI) dan Faktor-Faktor Risiko pada pasien <i>Peripheral Arterial Disease</i> (PAD)

EDITORIAL

Wabah COVID-19 Tahun 2021

Patrianef Darwis¹

¹Divisi Bedah Vaskular dan Endovaskular, Departemen Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/ Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo

Assalamualaikum wr wb.

Sejawat sekalian, tahun 2021 berada di depan mata kita dan tahun 2020 sudah hampir meninggalkan kita. Sangat banyak duka dan kesedihan kita selama menjalani tahun 2020 ini. Penyebab dari banyak kesusahan itu adalah wabah COVID-19.

Di tahun 2020 ini, semua sektor kehidupan terkena dampak oleh tersebarnya wabah COVID-19 di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai bagian masyarakat global yang nyaris tidak punya sekat dan batas maka dampak dari wabah ini menyebar ke seluruh pelosok dunia, bahkan tempat yang terpencil sekalipun. Sepanjang ada transportasi dan mobilitas orang ke wilayah tersebut maka penyebaran COVID-19 di tempat tersebut tidak bisa dihindari.

Kita sebagai spesialis bedah juga terkena dampak dalam berinteraksi dengan pasien yang biasanya selama ini tanpa sekat, saat ini kita membangun sekat dan penghalang dalam berkontak dan berinteraksi dengan pasien. Sekat dan

penghalang yang kita bangun berfungsi melindungi pasien dan diri kita tertular dan menularkan wabah COVID-19 selama proses interaksi berlangsung. Selain itu, jika pasien terkonfirmasi positif COVID-19 maka sekat dan penghalang yang dinamakan Alat Pelindung Diri tersebut semakin lengkap dan kompleks. Sungguh ini suatu hal yang tidak nyaman baik bagi pasien maupun bagi diri kita sendiri.

Selain dampak sosial, dampak ekonomi juga dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat termasuk dunia kedokteran. Pembayaran jasa dokter yang dihitung berdasarkan volume kerja juga terkena dampak karena tindakan dan operasi elektif dibatasi selama masa pandemi ini, dan jika pun itu dilaksanakan dengan pembatasan dan syarat ketat yang pada akhirnya dibebankan pada pasien. Hal minimal yang harus dilakukan oleh pasien adalah pembiayaan pemeriksaan RT-PCR dari *swab* tenggorokan. Selain dampak sosial, risiko kematian berada di depan seorang dokter saat menangani pasien,

EDITORIAL

sehingga banyak dokter dan tenaga kesehatan yang menderita COVID-19 bahkan meninggal akibat COVID-19.

Kejadian wabah yang berdampak berat baik secara sosial, ekonomi maupun psikologi juga membuat kita lebih kuat dan tangguh dalam menghadapi tantangan dimasa depan. Kita berharap bahwa kita akan semakin kuat ditahun depan.

Kita di Indonesia juga harus mencermati bahwa kecenderungan globalis yang selama ini terjadi akan berubah menjadi lokalis, dampak yang lebih sederhana misalnya pasien yang selama ini berobat keluar negeri akan jauh berkurang karena pembatasan mobilitas orang antar wilayah dan negara. Bagaimanapun, kecenderungan lokalis ini akan berlanjut di tahun 2021, karena kita tidak akan tahu pasti kapan ujung dari wabah COVID-19 ini.

Kita berharap wabah ini segera berakhir dan kita dapat kembali melanjutkan kehidupan dan berinteraksi dengan cara yang biasa dan wajar kembali. Harapan yang jelas ada di tahun depan adalah dengan dimulainya pemberian vaksin COVID-19 pada masyarakat dan tenaga kesehatan. Semoga tahun depan akan lebih baik dibandingkan tahun 2020.

Kami berharap agar semua anggota IKABI tetap menjaga kesehatan dengan

cara menjaga jarak dan sering mencuci tangan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Salam sehat untuk kita semua.

Korespondensi Penulis:

Patrianef Darwis

Divisi Bedah Vaskular dan Endovaskular.

Departemen Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran

Universitas Indonesia

Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo

email : patrianef@gmail.com

ORCID ID

<https://orcid.org/0000-0002-4982-9034>

ARTIKEL PENELITIAN

Hubungan antara Perubahan Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan Respon Kemoterapi Neoadjuvan Kombinasi Doksorubisin pada Penderita Kanker Payudara Lanjut Lokal di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung

Kiki Budiani. S¹, Maman Abdurahman², Kiki A. Rizki²

¹ Departemen Bedah, Universitas Padjadjaran, Bandung

² Departemen Bedah Onkologi, Universitas Padjadjaran, Bandung

Abstrak

Latar Belakang. Kanker payudara merupakan kanker dengan insidensi tertinggi pada wanita di Indonesia. Kemoterapi saat ini merupakan salah satu modalitas terapi yang digunakan dalam penatalaksanaan kanker payudara. Salah satu regimen yang paling banyak digunakan adalah Doksorubisin. Perubahan berat badan selama kemoterapi dapat berhubungan dengan prognosis yang buruk pada pasien kanker baik itu kenaikan berat badan ataupun penurunan berat badan. **Tujuan.** Mengetahui hubungan antara perubahan indeks massa tubuh (IMT) dengan respon kemoterapi pada penderita kanker payudara lanjut lokal yang telah menjalani kemoterapi neoadjuvan kombinasi Doksorubisin 6 siklus.

Metode. Rancangan penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik *cross-sectional* prospektif yaitu untuk mengetahui pengaruh perubahan indeks massa tubuh (IMT) terhadap respon kemoterapi neoadjuvan kombinasi Doksorubisin pada penderita kanker payudara lanjut lokal. Penelitian dilakukan di Poliklinik Bedah Onkologi dan ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung periode April 2019 sampai dengan Agustus 2019. Pasien kanker payudara yang akan menjalani kemoterapi dengan regimen Doksorubisin dilakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, dan ukuran tumor di awal siklus, setelah follow up 6 siklus kemoterapi diukur kembali berat badan, tinggi badan, dan ukuran tumor kemudian dinilai respon kemoterapi.

Hasil. Didapatkan hasil untuk kelompok dengan respon kemoterapi sebanyak 49 atau sebesar 81,7% dan kelompok tidak respon sebanyak 11 atau sebesar 18,3%. Rata-rata usia pasien adalah $47,9 \pm 8,79$ dengan stadium IIIA sebanyak 27 atau sebesar 45,0% dan IIIB sebanyak 33 atau sebesar 55,0%. Untuk IMT awal memiliki rata-rata sebesar $25,9 \pm 4,00$, dengan kategori

ARTIKEL PENELITIAN

berat badan kurang sebanyak 3 atau sebesar 5,0%, kisaran normal sebanyak 13 atau sebesar 21,7%, berisiko sebanyak 14 atau sebesar 23,3%, obesitas tingkat I sebanyak 27 atau sebesar 45,0% dan obesitas tingkat II sebanyak 3 atau sebesar 5,0%. Untuk perubahan IMT memiliki rata-rata sebesar $-1,04 \pm 1,719 \text{ kg/m}^2$. Terdapat perubahan berat badan pada kedua kelompok yaitu pada kelompok respon, BB berkurang sebanyak 35 atau sebesar 71,4%, BB tetap sebanyak 5 atau sebesar 10,2% dan BB bertambah sebanyak 9 atau sebesar 18,4%. Pada kelompok tidak respon, kategori BB berkurang sebanyak 5 atau sebesar 45,5%, BB tetap sebanyak 3 atau sebesar 27,3% dan BB bertambah sebanyak 3 atau sebesar 27,3%.

Kesimpulan. Perubahan Indeks Massa Tubuh (IMT) tidak menunjukkan kemaknaan terhadap respon kemoterapi maka dapat disimpulkan perubahan IMT tidak berpengaruh terhadap respon kemoterapi pada penderita kanker payudara lanjut lokal yang menjalani kemoterapi neoadjuvan kombinasi Doksorubisin.

(ISSN 2723-7494 J Bedah Indonesia. 2020;48:3-21)

Kata kunci : IMT, kanker payudara, doksorubisin, respon kemoterapi

Korespondensi penulis:

Kiki Budiani

Departemen Bedah, Universitas Padjadjaran, Bandung

Jalan Pasteur no. 38, Pasteur, Sukajadi, Bandung

Email : drqieki8206@gmail.com

ARTIKEL PENELITIAN

The Relationship between Changes in Body Mass Index (BMI) with Response of Neoadjuvant Chemotherapy Combination of Doxorubicin in Local Advanced Breast Cancer Patients at Dr. Hasan Sadikin Bandung Hospital

Kiki Budiani. S¹, Maman Abdurahman², Kiki A. Rizki²

¹ Surgery Department, Universitas Padjadjaran, Bandung

² Department of Oncology Surgery, Universitas Padjadjaran, Bandung

Abstract

Background. Breast cancer is one form of cancer with the highest incidence in women in Indonesia. Chemotherapy is one of the therapeutic modalities used in the management of breast cancer. One of the most widely used regimens is Doxorubicin. Changes in body weight during chemotherapy can be associated with a poor prognosis in cancer patients whether it is weight gain or weight loss.

Objective. To determine the relationship between changes in body mass index (BMI) with chemotherapy responses in patients with locally advanced breast cancer who have undergone 6-cycle combination of Doxorubicin neoadjuvant chemotherapy.

Methods. Design of this study was a prospective cross sectional with an analytical observational study to determine the effect of changes in body mass index (BMI) with responses to neoadjuvant chemotherapy of Doxorubicin in locally advanced breast cancer patients. The study was conducted at the Surgical Oncology Polyclinic and chemotherapy ward of Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung from April to August 2019. Breast cancer patients who underwent Doxorubicin chemotherapy were examined for body weight, height and tumor size at the beginning of the cycle and after 6 cycles of chemotherapy.

Result. The results for the group with chemotherapy response were 49 or 81.7% and the non-response group were 11 or 18.3%. The average age of the patients was 47.9 ± 8.79 , with Stage IIIA 27 or 45.0% and IIIB 33 or 55.0%. The initial BMI had an average of 25.9 ± 4.00 , with a category of underweight 3 or 5.0%, a normal range of 13 or 21.7%, a risk of 14 or 23.3% , obesity level I as much as 27 or 45.0% and obesity level II as much as 3 or by 5.0%. The change in BMI has an average of -1.04 ± 1.719 kg / m². There were changes in body weight in both groups, in the Response group, reduced weight were 35 or 71.4%, remained weight were 5 or 10.2% and increased weight were 9 or 18.4%. In the No response group , reduced weight were 5 or 45.5%, remained weight were 3 or 27.3% and increased weight were 3 or 27.3%.

Conclusion. Changes in Body Mass Index (BMI) did not significantly affect the responses of chemotherapy in patients with local advanced breast cancer undergoing Doxorubicin neoadjuvant chemotherapy.

Keywords : BMI, breast cancer, doxorubicin, chemotherapy response

ARTIKEL PENELITIAN

Latar Belakang

Kanker payudara merupakan masalah global dan isu kesehatan internasional yang penting. Kanker payudara adalah keganasan paling sering pada wanita di negara maju dan nomor dua setelah kanker serviks di negara berkembang dan merupakan 29% dari seluruh kanker yang didiagnosa tiap tahun.¹

Menurut data *Global Burden of Cancer Study* (GLOBOCAN) yang dikeluarkan oleh *International Agency for Research on Cancer* (IARC) tahun 2012, diketahui bahwa kanker payudara merupakan penyakit kanker dengan persentase kasus baru tertinggi, yaitu sebesar 43,3% dan persentase kematian akibat kanker payudara sebesar 12,9% (Depkes RI, 2015).^{2,3}

Diperkirakan 519.000 orang wanita meninggal akibat kanker payudara dan sebanyak 69% kematian tersebut di negara yang sedang berkembang.

Menurut Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) di Indonesia tahun 2007, diketahui bahwa kanker payudara menempati urutan pertama pasien rawat inap (16,85%) dan pasien rawat jalan (21,69%). Selain angka kejadian yang tinggi, kanker payudara juga memiliki angka mortalitas yang tinggi.

Tingginya angka kejadian dan mortalitas yang diakibatkannya membuat kanker payudara menjadi salah satu masalah kesehatan yang menarik perhatian dunia.^{4,5,6}

Di Indonesia kanker payudara merupakan kanker dengan insiden tertinggi nomor satu dan terdapat kecenderungan dari tahun ke tahun insidennya meningkat. Sebagian besar keganasan payudara datang pada stadium lanjut. Muchlis Ramli dkk pada penelitiannya di RSCM mendapatkan stadium IIIA dan IIIB sebanyak 43,3%, stadium IV sebanyak 14,3%, berbeda dengan negara maju dimana kanker payudara ditemukan lebih banyak dalam stadium dini. Ini mungkin karena kurangnya informasi, letak geografis, pendidikan, banyaknya iklan yang menerangkan tentang pengobatan alternatif, kurangnya alat diagnostik seperti mammografi, USG dan kurangnya keterampilan tenaga medis dalam mendiagnosis kanker payudara.¹

Pengobatan kanker payudara bertujuan untuk mendapatkan kesembuhan yang tinggi dengan kualitas hidup yang baik. Terdapat beberapa modalitas non pembedahan yang dikenal dalam penanganan kanker payudara yaitu kemoterapi, radioterapi, terapi biologis, dan

ARTIKEL PENELITIAN

terapi hormonal. Dari beberapa modalitas tersebut, kemoterapi merupakan terapi yang berkembang pesat dalam tatalaksana kanker.^{7,8}

Kemoterapi merupakan obat pembunuh sel kanker yang diberikan melalui jalur intravena atau peroral dan dapat diberikan setelah dilakukan pembedahan (kemoterapi adjuvan) dan sebelum dilakukan pembedahan (kemoterapi neoadjuvan). Pada awalnya kemoterapi digunakan dalam regimen tunggal. Seiring berkembangnya penelitian, terapi dengan regimen kombinasi menjadi pilihan pada saat ini. Terapi kombinasi ini memiliki tingkat respon yang lebih tinggi dibandingkan regimen tunggal. Salah satu obat kemoterapi yang efektif dalam terapi kanker payudara adalah golongan antrasiklin.^{7,8}

Antrasiklin merupakan golongan antibiotik yang memiliki efektivitas tinggi dalam penanganan sel-sel kanker, baik kanker hematologi maupun kanker solid, termasuk kanker payudara. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan antrasiklin antara lain Doksorubisin, Daunorubisin, Epirubisin, dan Idarubisin.^{7,8,9} Doksorubisin merupakan salah satu obat dari golongan antrasiklin yang paling sering

digunakan pada kemoterapi kombinasi kanker payudara.

Penelitian lain menyebutkan penambahan berat badan lebih banyak pada wanita premenopause, wanita yang mendapatkan kemoterapi dan wanita yang *overweight* saat didiagnosa. Kenaikan berat badan >5.9 kg setelah diagnosa berhubungan dengan risiko tinggi kematian karena kanker payudara.¹⁰

Usia, ukuran tumor, status kelenjar getah bening aksila, tipe histologis tumor dan grade patologi merupakan faktor prognosis pada kanker payudara. Beberapa penelitian melaporkan hubungan antara *overweight* dan obesitas pada diagnosis kanker payudara dan prognosis buruk dengan tingginya rekurensi dan mortalitas. Beberapa penelitian melaporkan bahwa penambahan berat badan setelah terkena kanker payudara dapat berperan pada efek dari beberapa regimen terapi.¹² Walaupun beberapa penelitian memperlihatkan peningkatan risiko kematian kanker payudara dalam era moden dari kemoterapi adjuvan berbasis antrasiklin dan taxan, hubungan antara indeks massa tubuh dan rekurensi serta kematian karena kanker payudara membutuhkan penelitian lebih lanjut dan hubungan dengan subtype patologis, yaitu reseptor estrogen (ER)/

ARTIKEL PENELITIAN

progesteron (PR) positif, HER2 negatif, positif, dan triple negatif.¹³

Beberapa penelitian lain mengamati efek dari perubahan berat badan pada prognosis pasien kanker payudara yang mendapatkan kemoterapi dan hormonal terapi. Penelitian ini melaporkan peningkatan rekurensi dan kematian karena kanker payudara dan mortalitas total pada pasien yang mengalami perubahan berat badan lebih dari 2 kg/m² dibandingkan pasien yang menjaga berat badannya. Penggunaan kemoterapi berbasis antrasiklin dilaporkan berhubungan dengan perubahan berat badan dan *overall survival* atau *disease free-survival*.¹²

Sedangkan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya melaporkan selama observasi tidak ada perubahan berat badan selama kemoterapi yang mengandung antrasiklin yang telah dikenal sebagai *gold standard* untuk terapi kanker payudara. Ini merupakan bukti bahwa perubahan berat badan selama kemoterapi dapat berhubungan dengan prognosis yang buruk pada pasien kanker baik itu kenaikan berat badan ataupun penurunan berat badan.¹²

Tetapi penelitian yang mencari tentang hubungan perubahan indeks massa tubuh (IMT) dengan respon kemoterapi neoadjuvan kombinasi doksorubisin

(regimen FAC) belum banyak dilakukan, terutama di Indonesia.

Untuk pasien dengan stadium lanjut lokal (stadium IIIA, IIIB, IIIC) dianjurkan kemoterapi neoadjuvan, 3 siklus sebelum operasi dan 3 siklus pasca operasi. Kemoterapi neoadjuvan adalah pemberian kemoterapi pada penderita kanker dengan *high grade malignancy* dan belum pernah mendapat tindakan lokal-regional dengan bedah atau radiasi. Kemoterapi neoadjuvan bertujuan untuk memperkecil ukuran tumor dan kontrol mikrometastasis, disamping itu kemoterapi neoadjuvan dapat memberikan informasi tentang respon kemoterapi.¹

Penilaian respons terhadap kemoterapi neoadjuvan dapat diklasifikasikan menurut kriteria evaluasi respons pada tumor padat (RECIST), dengan kriteria sebagai berikut : Tidak ada bukti klinis tumor pada payudara dan kelenjar getah bening aksila didefinisikan sebagai respons lengkap (CR). Pengurangan dalam diameter massa tumor terbesar melebihi 30 % dinilai sebagai respons parsial (PR). Pengurangan ukuran tumor kurang dari 30 % atau meningkat hingga 20 % pada diameter terbesar dianggap sebagai Penyakit stabil (SD). Tumor dengan kenaikan lebih dari 20 % pada diameter terbesar atau munculnya

ARTIKEL PENELITIAN

nodul baru dianggap sebagai penyakit progresif (PD).¹⁵

Indeks massa tubuh (IMT) adalah ukuran berat yang disesuaikan dengan tinggi, dihitung sebagai berat dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi meter (kg / m^2). Meski IMT sering dianggap sebagai indikator kegemukan tubuh, itu adalah ukuran pengganti lemak tubuh karena bisa mengukur kelebihan berat badan ketimbang kadar lemak berlebih. IMT adalah ukuran pengganti lemak tubuh yang sederhana, murah, dan tidak invasif. Berbeda dengan metode lain, IMT hanya bergantung pada tinggi dan berat badan dan dengan akses ke peralatan yang tepat, individu dapat meminta IMT mereka diukur dan dihitung secara rutin dengan akurasi yang masuk akal.¹⁶ Pada **Tabel 1** dapat dilihat kategori indeks massa tubuh untuk Asia Pasifik.

Kemoterapi memengaruhi penurunan energi ekpenditur (kecepatan metabolisme basal yang rendah, termogenesis, dan aktifitas fisik), dan perbedaan modifikasi dalam asupan diet (peningkatan nafsu makan atau penurunan nafsu makan akibat kemoterapi yang berhubungan dengan mual dan muntah) yang dapat mengarah ke penambahan ataupun penurunan berat

badan tergantung kebiasaan diet dari pasien yang akan berpengaruh pada respon dari kemoterapi. Resistensi insulin dapat menjadi mekanisme umum yang menjelaskan prognosis buruk dari pasien yang mengalami kehilangan berat badan maupun penambahan berat badan.^{12,17}

Metode

Rancangan penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik *cross-sectional* prospektif yaitu untuk mengetahui pengaruh perubahan indeks massa tubuh terhadap respon kemoterapi kombinasi doksorubisin pada penderita kanker payudara. Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan rancangan *cross-sectional*. Seluruh pasien yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi akan dimasukkan sebagai subjek penelitian. Konsep *Crossection study* atau metode potong lintang adalah untuk mengukur variabel tergantung dan bebas pada waktu bersamaan. Jenis penelitian ini berusaha mempelajari dinamika hubungan antara faktor-faktor risiko dengan dampak atau efeknya. Faktor risiko dan dampak atau efeknya diobservasi pada saat yang sama, artinya setiap subyek penelitian diobservasi hanya satu kali saja dan faktor

ARTIKEL PENELITIAN

risiko serta dampak diukur menurut keadaan atau status pada saat observasi.

Hasil

Penelitian dilakukan pada periode April 2019 sampai dengan Agustus 2019, dengan 60 subjek yang masuk kriteria inklusi penelitian (**Tabel 2**). Dengan demikian didapatkan total subjek yang telah menjalani kemoterapi kombinasi doksorubisin sebanyak 6 siklus sebesar 60 subjek.

Tabel 4. Terdapat perubahan berat badan pada kedua kelompok terhadap respon kemoterapi. Pada kelompok Respon, pasien dengan perubahan berat badan kategori BB berkurang sebanyak 35 atau sebesar 71,4%, BB tetap sebanyak 5 atau sebesar 10,2% dan BB bertambah sebanyak 9 atau sebesar 18,4%.

Tabel 4. Pada kelompok Tidak Respon, pasien dengan perubahan berat badan kategori BB berkurang sebanyak 5 atau sebesar 45,5%, BB tetap sebanyak 3 atau sebesar 27,3% dan BB bertambah sebanyak 3 atau sebesar 27,3%.

Tabel 4. Pada kedua kelompok terdapat subjek yang mengalami penurunan berat badan sebanyak 40 (66,7%), berat badan tetap atau tidak mengalami perubahan sebanyak 8 (13,3%) dan subjek yang mengalami kenaikan berat badan

sebanyak 12 (20%). Perubahan berat badan berkisar 1kg – 5 kg, dan hanya ada 2 subjek yang mengalami perubahan berat badan lebih dari 10 kg.

Tabel 6. Pada kelompok Respon, untuk pasien dengan perubahan IMT kategori $<2 \text{ kg/m}^2$ sebanyak 38 atau sebesar 77,6% dan $\geq 2 \text{ kg/m}^2$ sebanyak 11 atau sebesar 22,4%.

Tabel 6. Pada kelompok Tidak Respon, Untuk pasien dengan perubahan IMT kategori $<2 \text{ kg/m}^2$ sebanyak 9 atau sebesar 81,8% dan $\geq 2 \text{ kg/m}^2$ sebanyak 2 atau sebesar 18,2%.

Untuk analisis pada data kategorik di uji menggunakan uji *Chi Square* yaitu perubahan IMT. Hasil uji statistik pada kelompok penelitian diatas diperoleh informasi nilai P pada variabel perubahan IMT lebih besar dari 0,05 (nilai $P > 0,05$) yang berarti tidak signifikan atau tidak bermakna secara statistik.

Pembahasan

Selama periode penelitian didapatkan 60 pasien kanker payudara yang telah mendapatkan kemoterapi neoadjuvan kombinasi doksorubisin yang disertakan dalam penelitian Untuk pasien dengan IMT kategori berat badan kurang pada **Tabel 2**

ARTIKEL PENELITIAN

sebanyak 3 atau sebesar 5,0%, kisaran normal sebanyak 13 atau sebesar 21,7%, berisiko sebanyak 14 atau sebesar 23,3%, obesitas tingkat I sebanyak 27 atau sebesar 45,0% dan obesitas tingkat II sebanyak 3 atau sebesar 5,0%. Penelitian oleh Kogawa et al, didapatkan IMT awal rata-rata sebesar 27,9 kg/m² dengan kategori IMT normal sebanyak 31,5%, *overweight* sebanyak 31,1% dan obesitas sebanyak 37,3%. Hal ini berbeda karena didapatkan nilai tengah IMT yang lebih tinggi pada etnis Afrika – Amerika.¹⁸

Pada penelitian ini kedua kelompok yang menjalani kemoterapi neoadjuvan, terdapat variasi perubahan berat badan (BB). Terdapat perubahan berat badan pada kelompok respon **Tabel 4**, pasien dengan BB berkurang sebanyak 35 atau sebesar 71,4%, BB tetap sebanyak 5 atau sebesar 10,2% dan BB bertambah sebanyak 9 atau sebesar 18,4%. **Tabel 4**, pada kelompok Tidak Respon, terdapat pasien dengan BB berkurang sebanyak 5 atau sebesar 45,5%, BB tetap sebanyak 3 atau sebesar 27,3% dan BB bertambah sebanyak 3 atau sebesar 27,3%. Penelitian oleh Kogawa et al, setelah kemoterapi neoadjuvan didapatkan perubahan kategori indeks massa tubuh paling banyak yaitu kategori obesitas,

dimana pasien dengan obesitas menunjukkan *Reccurent Free Survival(RFS)* dan *Overall Survival(OS)* yang lebih buruk dibandingkan pasien dengan IMT normal dan *overweight*.¹⁸ Sedangkan penelitian oleh Thivat et al, didapatkan 31% pasien yang menjalani kemoterapi mengalami perubahan berat badan > dari 5% berat badan awal dimana berhubungan dengan peningkatan risiko rekurensi dan kematian.¹²

Tabel 5. Pada penelitian ini didapatkan perubahan rata-rata IMT adalah $-1,14 \pm 1,744$ kg/m² pada kelompok Respon kemoterapi dan rata – rata perubahan IMT adalah $-0,57 \pm 1,594$ kg/m² pada kelompok Tidak Respon dengan kategori IMT obesitas kelas I sebanyak 27 atau 45,0% dan obesitas kelas II sebanyak 3 atau 5,0%. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa perubahan berat badan secara signifikan terjadi pada 50- 96 % pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi.¹⁹ Perubahan berat badan dilaporkan bervariasi antara 2,5 kg – 6,2 kg, dimana perubahan berat lebih dari 10 kg sangat jarang. Beberapa penelitian terkini oleh Van den Berg dan Winkels melaporkan perubahan berat badan lebih rendah (35 – 85 %) dimana perubahan berat

ARTIKEL PENELITIAN

bervariasi antara 1,4 – 5,0 kg. Perubahan berat badan diperkirakan karena perbedaan tipe kemoterapi, ukuran sampel, status menopause, indeks massa tubuh awal, metode penelitian, waktu saat pengukuran berat badan, tahun publikasi, negara, dan kualitas penelitian.¹⁹ Pada penelitian ini kedua kelompok mengalami perubahan berat badan berkisar 1 kg – 5 kg, dan hanya ada 2 subjek yang mengalami perubahan berat badan lebih dari 10 kg.

Tabel 2. Pada penelitian ini didapatkan jumlah pasien yang mengalami obesitas kelas 1 sebanyak 27 pasien (45,0%) dan obesitas kelas 2 sebanyak 3 pasien (5,0%), dan stadium IIIB sebanyak 33 orang (55%) pada saat didiagnosis. Pada pasien yang obesitas terdapat kemungkinan tumor yang lebih besar pada stadium lanjut, dan dapat mempengaruhi adanya dosis kemoterapi yang tidak tepat yang berakibat berkurangnya efektifitas klinis kemoterapi. Perubahan berat badan setelah diagnosis kanker prognosisnya cenderung lebih buruk, kebanyakan wanita mengalami perubahan berat badan setelah terdiagnosis kanker, dimana beberapa penelitian menunjukkan perubahan berat badan terjadi pada 50 -96 % pasien. Perubahan metabolisme pasien, aktivitas fisik, dan

intake diet diduga sebagai mekanisme terjadinya perubahan berat badan.²⁰

Pada penelitian ini didapatkan tidak hanya penurunan berat badan tetapi ada beberapa pasien yang mengalami kenaikan berat badan selama menjalani kemoterapi. Hal ini konsisten dengan beberapa literatur yang menyebutkan kenaikan berat badan lebih jelas pada wanita premenopause. Kombinasi dari beberapa faktor tentu dapat berperan dalam hal ini termasuk tipe dari kemoterapi, lamanya perawatan, serta kegagalan ovarium dan perbedaan perilaku dan gaya hidup.¹⁸

Pada penelitian ini didapatkan variasi perubahan IMT, dimana IMT awal subjek dengan kategori berat badan kurang (**Tabel 2**) sebanyak 3 atau sebesar 5,0%, kisaran normal sebanyak 13 atau sebesar 21,7%, berisiko sebanyak 14 atau sebesar 23,3%, obesitas tingkat I sebanyak 27 atau sebesar 45,0% dan obesitas tingkat II sebanyak 3 atau sebesar 5,0% namun tidak berpengaruh terhadap respon kemoterapi neoadjuvan. Sesuai dengan literatur yang menyebutkan IMT awal sebagai variabel kontinu tidak signifikan berhubungan terhadap patologis respon komplis kemoterapi.²¹ Pada penelitian ini tidak dicantumkan data mengenai status

ARTIKEL PENELITIAN

menopause, tipe imunohistokimia, latihan dan kebiasaan diet pasien, atau penggunaan hormon steroid lain yang dapat mempengaruhi perubahan berat badan dan meningkatkan resiko kanker payudara.

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Pada penelitian ini tidak disertakan status menopause, tipe imunohistokimia, dan kadar gula darah

Kesimpulan

Tidak terdapat hubungan antara perubahan indeks massa tubuh (IMT) dengan respon kemoterapi pada pasien kanker payudara lanjut lokal yang mendapatkan kemoterapi neoadjuvan kombinasi doksorubisin.

Daftar Pustaka

1. Suyatno, Pasaribu ET. Bedah Onkologi Diagnosis dan Terapi. *Kanker Payudara*. Jakarta: CV Sagung Seto. Edisi ke-2. 2012. Hlm. 45-71
2. Sobri FB, Azhar Y, Wibisana IGN.G, Rachman A. *Manajemen Terkini Kanker Payudara*. Depok: Media Aesculapius. Edisi ke-1 2017. Hlm. 5-54.
3. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Riset kesehatan dasar 2013. [Diunduh 05 August 2016]. Melalui: www.depkes.go.id/resources/download/general/Hasil20Riskedas202013.pdf
4. Jemal A, Tiwari R, Murray T, Siegel R, Ghafoor A, Ward E, et al. *Cancer statistics 2008*. CA Cancer J Clin. 2008 Mar-Apr; 58(2): 71-96.
5. World Health Organization. *Breast cancer: prevention and control*. 2016. [Diunduh 05-08-2016]. Melalui: <http://www.who.int/cancer/detection/breastcancer/en/index1.html>.
6. International Agency for Research on Cancer (IARC). *Globocan 2008; Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide*. Lyon. 2012.
7. Manuaba IBTW. *Kanker Payudara*. Panduan Penatalaksanaan Kanker Solid PERABOI 2010: Sagung Seto; 2010. Hlm. 33-37.
8. Chalasani P. *Breast Cancer Treatment and Management*. Medscape; 2017 [Diunduh 05-01-2018]. Melalui : <https://emedicine.medscape.com/article/1947145-treatment>.
9. Rahman AM, Yusuf SW, Ewer MS. *Anthracycline-induced cardiotoxicity*

ARTIKEL PENELITIAN

- and the cardiac-sparing effect of liposomal formulation. International Journal of Nanomedicine*.2007;2(4):567-583.
10. Ruiz MP.,Tarifa CM, Goffin JJV, Friedman, Slingerland. *Obesity and Adverse breast Cancer Risk and Outcome : Mechanistic Insights and Strategies*. cancerjournal.com.2017; volume 67. number 5.
 11. Brunicardi FC, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Matthews JB, et al.*The Breast*. Schwartz's Principles of Surgery. Tenth edition.McGraw-Hill Education: United States.2015. p: 511-511
 12. Thivat E,Thronde S, Lapirot O, Abrial C, Gimbergues P, Gadea E, et al. *Weight Change during chemotherapy changes the prognosis in non metastatic breast cancer for the worse*. [Diunduh 17 November 2017]. Melalui: <http://www.biomed.central.com/1471-2407/10/648>.
 13. Pajares B, Pollan M, Martin M, Mackey JR, Lluch A, Gavila J, et al. *Obesity and Survival in Operable Breast Cancer Patients Treated with Adjuvant Anthracyclines and Taxanes according to Pathological Subtypes:a pooled analysis*. [Diunduh 17 November 2017]. Melalui: <http://breast-cancer-research.com/content/15/6/R105>
 14. Anders CK, Johnson R, Litton J, Phillips M, and Bleyer A. *Breast cancer before age 40 years*. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles>.
 15. Therasse P, Arbuck SA, Eisenhauer EA.*New Guidelines to Evaluate the Response to Treatment in Solid Tumors*. Journal of the National Cancer Institute, Vol. 92, No. 3, February 2, 2000.
 16. Thorn CF, Oshiro C, Marsh S, Boussard TH, McLeod H, Klein TE, et al. *Doxorubicin pathways: pharmacodynamics and adverse effects*. Pharmacogenetics and Genomics.2011 July; 21(&): 440-446
 17. Centers for Disease Control and Prevention. *Body Mass Index : Consideration for Practitioners References List*. [diunduh 09 November 2017]. Melalui <http://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/>.
 18. Indeks Massa Tubuh Menurut WHO dan Asia Pasifik. Melalui <http://perawatankesehatan.com/indeks-massa-tubuh/>

ARTIKEL PENELITIAN

19. What is Diabetes? Melalui: <https://www.niddk.nih.gov/healthinformation/diabetes/overview/What-is-diabetes/prediabetes-insulin-resistance>.
20. Van den Berg MMGA, Winkels RM, Kruif JThCM, Laarhoven HWMV, Visser M, Vries JHM, et al. *Weight Change during Chemotherapy in Breast Cancer patients : a meta-analysis*. BioMed Central. 2017. 17 : 259
21. Champ CE, Volek JS, Siglin J, Jin L, Simone NL, *Weight Gain, Metabolic Syndrome, and Breast Cancer Recurrence: Are Dietary Recommendations Supported by the Data?* International Journal of Breast Cancer. Volume 2012, Article ID 506868, 9 pages.
22. Kogawa T, Fujii T, Fouad TM, Liu DD, Harano K, Masuda H, et al. *Impact of Change in Body Mass Index during Neoadjuvant Chemotherapy and Survival among Breast Cancer Subtypes*. Breast Cancer Research and Treatment. 2018

ARTIKEL PENELITIAN

Daftar Tabel

Tabel 1. Kategori indeks massa tubuh untuk Asia Pasifik

Kategori	IMT (kg/m ²)
Berat badan kurang	< 18,5
Kisaran normal	18,5-22,9
Berat badan lebih	> 23,0
Berisiko	23,0-24,9
Obesitas tingkat I	25,0-29,9
Obesitas tingkat II	≥30,0

Dikutip dari Indeks Massa Tubuh menurut WHO dan Asia Pasifik²¹

ARTIKEL PENELITIAN

Tabel 2. Karakteristik subjek penelitian

Variabel	N=60
Usia (tahun)	
Rerata $\pm$ Simpangan baku	47,9 $\pm$ 8,79
Nilai Tengah	48,00
Rentang (min-maks)	28,00-74,00
Stadium	
IIIA	27 (45.0%)
IIIB	33 (55.0%)
IMT Sebelum	
Rerata $\pm$ Simpangan baku	25,9 $\pm$ 4,00
Nilai Tengah	26,32
Rentang (min-maks)	16,21-36,09
IMT Sesudah	
Rerata $\pm$ Simpangan baku	24,9 $\pm$ 3,50
Nilai Tengah	25,04
Rentang (min-maks)	16,88-32,45
Kategori IMT	
Berat badan kurang	3 (5,0%)
Kisaran normal	13 (21,7%)
Berisiko	14 (23,3%)
Obesitas tingkat I	27 (45,0%)
Obesitas tingkat II	3 (5,0%)

ARTIKEL PENELITIAN

Tabel 3. Perbandingan Karakteristik Subjek Penelitian berdasarkan Respon Kemoterapi.

Variabel	Respon Kemo		Nilai P
	Respon	Tidak Respon	
	N=49	N=11	
Usia (tahun)			0,147
Rerata ± Simpangan baku	47,2 ± 9,16	51,4 ± 6,02	
Nilai Tengah	47,00	50,00	
Rentang (min-maks)	28,00-74,00	43,00-60,00	
Stadium			0,481
IIIA	21 (42,9%)	6 (54,5%)	
IIIB	28 (57,1%)	5 (45,5%)	

ARTIKEL PENELITIAN

Tabel 4. Perubahan Berat Badan berdasarkan Respon Kemoterapi.

Variabel	Respon Kemo		Nilai P
	Respon	Tidak respon	
	N=49	N=11	
Perubahan Berat badan			0,579
BB Berkurang	35 (71,4%)	5 (45,5%)	
BB Tetap	5 (10,2%)	3 (27,3%)	
BB Bertambah	9 (18,4%)	3 (27,3%)	

ARTIKEL PENELITIAN

Tabel 5. Perbandingan IMT sebelum , IMT Sesudah dan Perubahan IMT berdasarkan Respon Kemoterapi.

Variabel	Respon Kemoterapi		Nilai P
	Respon N=49	Tidak respon N=11	
IMT sebelum			0,767
Rerata±Simpangan baku	26,0 ± 3,73	25,6 ± 5,22	
Nilai Tengah	26,34	25,10	
Rentang (min-maks)	16,21-32,89	18,3-36,09	
IMT sesudah			0,877
Rerata±Simpangan baku	24,8 ± 3,33	25,0 ± 4,35	
Nilai Tengah	24,99	25,10	
Rentang (min-maks)	16,88-32,45	18,31-32,39	
Perubahan IMT			0,115
Rerata±Simpangan baku	-1,14 ± 1,744	-0,57 ± 1,594	
Nilai Tengah	-0,88	0,00	
Rentang (min-maks)	-8,56-2,13	-3,70-0,92	

ARTIKEL PENELITIAN

Tabel 6. Perbandingan Kategori Perubahan IMT berdasarkan Respon Kemoterapi

Variabel	Respon Kemo		Nilai P
	Respon N=49	Tidak respon N=11	
Kategori Perubahan IMT			0,756
<2 kg/m ²	38 (77,6%)	9 (81,8%)	
>= 2kg/m ²	11 (2,4%)	2 (18,2%)	

ARTIKEL PENELITIAN

**Perbandingan Efektivitas Pemberian Erythromycin dan
Metoclopramide sebagai Prokinetik Pasca Operasi Laparotomi
Digestif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda
Aceh**

Syahmardani Ibnu¹, Ferry Erdani², Jufriady Ismy²

¹Program Pendidikan Spesialis Ilmu Bedah, Fakultas Kedokteran Universitas Syiah
Kuala, Banda Aceh

²Staff Bagian KSM Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala/Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh, Indonesia

Abstrak

Latar Belakang. Gastroparesis atau ileus pasca operasi (IPO) merupakan kondisi yang normal, bersifat sementara, dan merupakan respon fisiologis pasca prosedur operasi abdominal. Jika berkepanjangan, IPO dapat meningkatkan morbiditas dan beban biaya kesehatan. Beberapa obat yang berperan sebagai prokinetik, seperti diantaranya metoclopramid dan erythromycin. Penggunaan kedua obat tersebut masih sangat minim khususnya di Indonesia dalam konteks mencegah terjadinya IPO.

Tujuan. Menilai efektifitas *erythromycin* dan *metoclopramide* sebagai prokinetik pada pasien yang menjalani prosedur pembedahan laparotomi.

Metode. Penelitian uji klinis ketersamaran ganda dengan desain paralel. Subjek dibedakan menjadi dua kelompok perlakuan yaitu dengan pemberian erythromycin 250 mg dan metoclopramide 10 mg secara oral 60 menit sebelum operasi. *Independent T-test* digunakan sebagai analisa utama dengan tingkat kepercayaan 95%.

Hasil. 38 subjek terlibat dalam penelitian ini yang didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan rerata usia $45,11 \pm 15,38$ dan $53,84 \pm 10,73$ pada kelompok *erythromycin* dan *metoclopramide* secara berurutan. Rerata residu volume cairan lambung kelompok *erythromycin* ($33,26 \pm 15,33$ ml/24 jam) lebih minimal dibandingkan kelompok *metoclopramide* ($49,95 \pm 17,71$ ml/24 jam) dengan nilai signifikansi $p=0,004$.

Kesimpulan. Pemberian *erythromycin* lebih efektif dibandingkan *metoclopramide* sebagai agen prokinetik pasca pembedahan digestif.

Kata Kunci: Prokinetik, gastroparesis, ileus pasca operasi, erythromycin, metoclopramide,

ARTIKEL PENELITIAN

operasi laparotomy digestif

(ISSN 2723-7494 J Bedah Indonesia. 2020;48:22-31)

Korespondensi penulis:

Syahmardani Ibnu

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, RSUD dr Zainoel Abidin

Email : hasrulsyahputra@gmail.com

Pendahuluan

Postoperative ileus atau ileus pasca operasi (IPO) merupakan kondisi yang normal, bersifat sementara, dan merupakan respon fisiologis pasca prosedur operasi abdominal. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh inhibisi reflek neuronal, meningkatnya sekresi neurotransmitter inhibitor di usus, dan meningkatnya reaksi inflamasi akibat proses pembedahan. Gejala kembung merupakan manifestasi yang paling umum dikeluhkan oleh pasien. Selain itu, IPO juga dapat menimbulkan gejala gastrointestinal lain seperti nyeri perut, mual, dan muntah.¹ Jika berkepanjangan, IPO dapat meningkatkan morbiditas dan beban biaya kesehatan.²⁻⁴ Dilaporkan insidensi terjadinya sangat bervariasi tergantung pada penulis dan jenis spesialisik, namun secara umum antara 10% hingga 30% untuk bedah abdomen.⁵ Pada IPO dapat terjadi *delayed gastric emptying* (DGE) atau keterlambatan pengosongan lambung. Prevalensi terjadinya DGE adalah berkisar antara 14% hingga 30% pasca operasi.⁶ Disamping menimbulkan komplikasi ekstrim tersebut, IPO juga dapat menyebabkan dehidrasi, gangguan keseimbangan elektrolit, atau sepsis.⁷

Salah satu upaya untuk mengatasi dan mencegah timbulnya IPO adalah dengan memberikan prokinetik pada pasien sebelum dan sesudah prosedur operasi. Prokinetik merupakan obat yang digunakan untuk meningkatkan motilitas dan pasase komponen dalam traktus gastrointestinal, utamanya dengan meningkatkan kontraksi otot gastrointestinal.

Beberapa jenis prokinetik gastrik memiliki mekanisme kerja meningkatkan kontraktilitas gaster, berupa antagonis reseptor dopamine, agonis reseptor motilin, agonis reseptor serotonin (5-hydroxytryptamine [5-HT] type 4 [5-HT₄]), inhibitor cholinesterase dan agonis ghrelin.⁸ *American College of Gastroenterology* (ACG) yang dipublikasi pada tahun 2013 merekomendasikan penggunaan prokinetik pada gastroparesis. Terdapat beberapa obat yang berperan sebagai prokinetik, seperti diantaranya metoclopramid dan erythromycin. Berbeda dengan metoclopramide yang merupakan obat untuk mengurangi mual dan gejala gastrointestinal lain, erythromycin ternyata juga memiliki efek prokinetik selain fungsi utamanya sebagai antibiotik. Obat ini merupakan golongan makrolid yang pada dosis kecil (dosis sub-antibiotik) dapat

ARTIKEL PENELITIAN

berperan sebagai prokinetik. Mekanisme kerjanya adalah dengan berikatan dengan reseptor motilin pada otot polos traktus gastrointestinal.¹ Walaupun telah banyak studi yang telah merumuskan bukti ilmiah Erythromycin dan Metoclopramide sebagai agen prokinetik khususnya terkait prosedur pembedahan, penggunaan kedua obat tersebut masih sangat minim khususnya di Indonesia dalam konteks mencegah terjadinya IPO. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengevaluasi perbandingan efektivitas antara pemberian Erythromycin dan Metoclopramide dalam mencegah ileus pasca operasi digestif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian uji klinis (*clinical trials*) desain paralel. Uji klinis adalah penelitian eksperimental terencana yang dilakukan pada manusia. Intervensi yang diberikan pada pasien dalam penelitian adalah pemberian erythromycin dan metoclopramide sebelum operasi sebagai prokinetik untuk mencegah ileus pasca operasi digestif di RSUDZA Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan di ruang rawat

bedah dan Instalasi Bedah Sentral RSUDZA Banda Aceh. Pengambilan data dilakukan setelah mendapatkan surat keterangan etik (*ethical clearance*) yang diterbitkan oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin - Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh hingga jumlah subjek berdasarkan perhitungan besar sampel tercapai. Subjek penelitian adalah sebagian populasi terjangkau yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, serta keluarga pasien bersedia mengikuti penelitian dengan menandatangani formulir persetujuan dan *informed consent*. Kriteria inklusi penelitian ini adalah berusia ≥ 18 tahun; status fisik menurut *American Society of Anesthesiology* (ASA) I dan II; akan menjalani prosedur operasi laparotomy digestif.

Kriteria eksklusi penelitian ini adalah alergi terhadap *erythromycin* dan *metoclopramide*; menggunakan obat yang mengganggu metabolisme *erythromycin* (terfenadine) dan *metoclopramide*; menderita gangguan fungsi ginjal dan hati berat; menderita penyakit esofagus dan faring; penderita asma dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) atau infeksi paru akut; *Glasgow coma scale* (GCS) < 13 ;

ARTIKEL PENELITIAN

riwayat operasi digestif sebelumnya; wanita hamil dan menyusui; operasi > 3 jam; tidak menderita Diabetes Melitus.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyamaran ganda (*double blind*), dimana baik subjek penelitian maupun peneliti tidak mengetahui kedalam kelompok mana subjek dialokasikan. Teknik yang penyamaran yang digunakan adalah dengan cara memasukkan *Erythromycin* 250 mg dan *Metoclopramide* 10 mg ke dalam kapsul yang identik dan diberikan penanda pada botol penyimpanannya tanpa menulis kandungan obatnya. Pasien mengonsumsi obat tersebut secara oral 60 menit sebelum operasi. Proses penyamaran dilakukan oleh residen bedah yang berperan sebagai pihak ketiga dalam penelitian ini. Data penelitian yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung pasien yang menjadi subjek penelitian.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan keluarga pasien dan pemeriksaan laboratorium darah. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari rekam medik pasien yang meliputi nama, umur, tempat dan tanggal lahir serta data data klinis lainnya yang mendukung data penelitian. Prosedur kerja hanya akan

dilakukan jika subjek penelitian telah mengisi lembar pernyataan kesediaan atau *informed-consent*. Data yang didapat akan dirahasiakan.

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji T tidak berpasangan (*unpaired T test*) untuk menilai perbandingan rerata volume residu cairan lambung masing – masing kelompok. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan sistem komputerisasi menggunakan *software* SPSS versi 24 tahun 2016 dengan derajat kemaknaan alfa 95%.

Hasil

Berdasarkan data yang dikumpulkan selama 3 bulan sejak September hingga November 2019 terhadap pasien yang menjalani operasi laparotomi elektif di RSUDZA Banda Aceh, didapatkan sebanyak 38 subjek yang terlibat dalam penelitian yang terbagi menjadi dua kelompok berupa kelompok dengan pemberian *erythromycin* dan *metoclopramide* dengan jumlah masing-masing sebanyak 19 orang.

Selanjutnya analisis perbandingan efektifitas pemberian *erythromycin* dan *metoclopramide* sebagai prokinetik pasca operasi elektif laparotomi dilakukan

ARTIKEL PENELITIAN

menggunakan uji t tidak berpasangan (independent t test). Berdasarkan uji T tidak berpasangan, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara volume residu lambung antar kedua kelompok dengan signifikansi $p = 0,004$. Hasil analisis data yang disajikan pada **Tabel 2** menyimpulkan terdapat adanya perbedaan yang signifikan antara residu volume cairan lambung antar kelompok pasien yang diberikan metoclopramide dan erythromycin sebagai agen prokinetik. Kelompok pasien yang diberikan erythromycin memiliki volume residu lambung yang lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok yang diberikan Metoclopramide dengan selisih 16,69 mL/24 jam.

Pembahasan

Terdapat berbagai modalitas tatalaksana gastroparesis seperti halnya terapi diet, mengganti kehilangan cairan dan elektolit, pemberian nutrisi tambahan dan melakukan stimulasi pengosongan lambung.^{9,10} Berdasarkan panduan (guideline) untuk tatalaksana gastroparesis, pemberian agen prokinetik merupakan salah satu modalitas untuk meningkatkan kinerja sistem gastrointestinal. Agen

prokinetik merupakan medikasi yang diberikan untuk meningkatkan koordinasi motilitas sistem gastrointestinal, utamanya sinkronisasi kontraksi otot gastrointestinal. Prokinetik meningkatkan koordinasi berbagai segmen usus yang bermanfaat untuk fungsi propulsi luminal. Beberapa jenis prokinetik tertentu bersifat selektif pada area spesifik di traktus gastrointestinal karena memiliki reseptor target yang khusus.³¹ Gastric prokinetic memiliki fungsi utama meningkatkan kontraktilitas gaster termasuk dopamine receptor antagonist, motilin receptor agonist, serotonin (5-hydroxytryptamine [5-HT] type 4 [5-HT₄]) receptor agonist, cholinesterase inhibitors dan ghrelin agonist. Metoclopramide termasuk dalam golongan dopamine receptor antagonist yang sering dijadikan sebagai agen prokinetik. Obat ini menjadi pilihan pertama yang telah disetujui oleh United States Food and Drug Administration (FDA) untuk indikasi gastroparesis.¹⁰ Pada suatu studi dilaporkan bahwa pemberian metoclopramide meningkatkan fungsi pengosongan lambung pada 56% pasien yang mengalami gastroparesis dibandingkan dengan plasebo.¹⁰ Efek peningkatan pengosongan lambung oleh metoclopramide juga di evaluasi dalam penelitian dengan menilai jumlah residu

ARTIKEL PENELITIAN

volume cairan lambung pasca pembedahan serta membandingkannya dengan pemberian Erythromycin. Selain itu, erythromycin juga terbukti lebih efektif untuk tatalaksana dan mencegah terjadinya obstruksi usus halus berdasarkan tiga kasus yang dilaporkan oleh Rea dkk dibandingkan dengan terapi lain berupa metoclopramide dan laxative yang memiliki efek parsial. Saat ini, Medicines and Healthcare product Regulatory Agency (MHRA) sedang meningkatkan perhatian pada metoclopramide oleh karena efek samping neurologis yang ditimbulkannya berupa gangguan ekstrapiramidal dan tardive dyskinesia.¹¹ Erythromycin tidak menimbulkan efek neurologis serta memiliki efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan metoclopramide dalam mempercepat proses penngosongan lambung. Namun demikian, penggunaan jangka panjang perlu mendapat perhatian oleh karena dapat berkaitan dengan resistensi antibiotik dan prolonged QT syndrome.¹²

Kesimpulan

Pemberian Erythromycin lebih efektif dibandingkan Metoclopramide sebagai prokinetik pasca operasi laparotomi digestif di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.

Referensi

1. Lightfoot AJ, Eno M, Kreder KJ, O'Donnell MA, Rao SS, Williams RD. Treatment of postoperative ileus after bowel surgery with low-dose intravenous erythromycin. *Urology*. 2007;69(4):611-5.
2. Chang SS, Baumgartner RG, Wells N, Cookson MS, SMITH JR JA. Causes of increased hospital stay after radical cystectomy in a clinical pathway setting. *The Journal of urology*. 2002;167(1):208-11.
3. Asgeirsson T, El-Badawi KI. Postoperative ileus: it costs more than you expect. *Journal of the American College of Surgeons*. 2010;210(2):228-31.
4. Tevis SE, Carchman EH, Foley EF, Harms BA, Heise CP, Kennedy GD. Postoperative ileus—more than just prolonged length of stay? *Journal of Gastrointestinal Surgery*. 2015;19(9):1684-90.
5. Moghadamyeghaneh Z, Hwang GS, Hanna MH, Phelan M, Carmichael JC, Mills S, et al. Risk factors for prolonged ileus following colon surgery. *Surgical endoscopy*. 2016;30(2):603-9.

ARTIKEL PENELITIAN

6. Parmar AD, Sheffield KM, Vargas GM, Pitt HA, Kilbane EM, Hall BL, et al. Factors associated with delayed gastric emptying after pancreaticoduodenectomy. *HPB*. 2013;15(10):763-72.
7. Venara A, Neunlist M, Slim K, Barbieux J, Colas P, Hamy A, et al. Postoperative ileus: pathophysiology, incidence, and prevention. *Journal of visceral surgery*. 2016;153(6):439-46.
8. Acosta A, Camilleri M. Prokinetics in gastroparesis. *Gastroenterology Clinics*. 2015;44(1):97-111.
9. Millan M, Biondo S, Fraccalvieri D, Frago R, Golda T, Kreisler E. Risk factors for prolonged postoperative ileus after colorectal
10. Nakabayashi T, Mochiki E, Kamiyama Y, Haga N, Asao T, Kuwano H. Erythromycin induces pyloric relaxation accompanied by a contraction of the gastric body after pylorus-preserving gastrectomy. *Surgery*. 2003;133(6):647-55.
11. Agah J, Baghani R, Rakhshani MH, Rad A. Metoclopramide role in preventing ileus after cesarean, a clinical trial. *European journal of clinical pharmacology*. 2015;71(6):657-62.
12. Czarnetzki C, Elia N, Frossard J- L, Giostra E, Spahr L, Waeber J- L, et al. Erythromycin for gastric emptying in patients undergoing general anesthesia for emergency surgery: a randomized clinical trial. *JAMA surgery*. 2015;150(8):730-7.

ARTIKEL PENELITIAN

Daftar Gambar dan Tabel

Gambar 1. Variabel independen dan dependen penelitian

Tabel 1. Karakteristik subjek penelitian

Karakteristik	Kelompok E (n=19)	Kelompok M (n=19)
Usia (tahun)	45,11 ± 15,38	53,84 ± 10,73
Durasi Operasi (menit)	138,95 ± 30,34	117,63 ± 34,73
Jenis Kelamin (L/P)	13/6	14/5

Data diatas disajikan berdasarkan nilai rerata SD. Kelompok E: Kelompok dengan pemberian Erythromicin; Kelompok M: Kelompok dengan pemberian Metoclopramide

ARTIKEL PENELITIAN

Tabel 2. Perbandingan efektifitas pemberian erythromycin dan metoclopramide sebagai prokinetik pasca operasi elektif laparotomi

Variabel Penelitian	Rerata $\pm$ SD	Nilai p*
Residu Kelompok E (n = 19)	33,26 $\pm$ 15,33	0,004
Residu Kelompok M (n = 19)	49,95 $\pm$ 17,71	

* *Independent t test* , **Kelompok E:** Kelompok dengan pemberian Erythromycin; **Kelompok M:** Kelompok dengan pemberian Metoclopramide

ARTIKEL PENELITIAN

Gambaran Kualitas Hidup Pasien Pasca Trauma Kepala Sedang dan Berat dengan Lesi Intrakranial Menggunakan Parameter EUROQOL Group EQ-5D-5L di Departemen Bedah Saraf Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung

Eldy Muhammad Noor¹, M. Zafrullah Arifin², Agung Budi Sutiyono²

¹ *Departemen Bedah, Universitas Padjadjaran, Bandung*

² *Divisi Bedah Saraf, Departemen Bedah Saraf, Universitas Padjadjaran, Bandung*

Abstrak

Latar Belakang : Trauma kepala merupakan salah satu penyebab utama kematian pada pengguna kendaraan bermotor di negara berkembang. Angka kematian pasien pasca trauma kepala saat perawatan di rumah sakit cukup tinggi. Literatur tentang kualitas hidup pasien pasca trauma kepala atau pasien neurologis di negara berkembang sangat terbatas.

Tujuan: Menilai kualitas hidup pasien trauma kepala sedang dan berat dengan lesi intrakranial di bagian Bedah Saraf RS. Hasan Sadikin Bandung menggunakan kuisioner EQ-5D-5L.

Metode : Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional deksriptif prospektif, dengan subjek penelitian pasien bedah saraf yang masuk ke ruang gawat darurat RS. Hasan Sadikin dan memenuhi kriteria inklusi. Dilakukan pemeriksaan awal oleh dokter bedah saraf dan dilakukan pemeriksaan CT-Scan, kemudian dilanjutkan dengan mengisi kuisioner F1, selama perawatan akan mengisi F2, dan sebelum pulang mengisi F3, selanjutnya *follow-up* selama bulan 1, 2, dan 3 akan mengisi format F4.1, F4.2 dan F4.3. Sampel diambil dengan cara *Consecutive Sampling*.

Hasil : Dari 721 pasien trauma kepala yang masuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) bagian bedah saraf Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) selama periode 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Januari 2019, didapatkan 22 (3,05 %) orang meninggal di IGD, 23 orang (3,2 %) pulang paksa sebelum dilakukan *interview*, dan diperoleh 36 pasien (4,5 %) yang masuk kriteria inklusi dan ikut dalam penelitian ini.

Berdasarkan skala dimensi Euroqol EQ-5D mobilisasi saat pulang tidak ada masalah sebanyak 35%, sedikit masalah 62 %, dan masalah sedang 3 %. Skala perawatan diri didapatkan pasien yang saat pulang tidak ada masalah sebanyak 10%, sedikit masalah 87 %, dan masalah sedang 3 %. Skala aktifitas biasa didapatkan pada saat pulang tidak ada masalah sebanyak 3%, sedikit

ARTIKEL PENELITIAN

masalah 87 %, dan masalah sedang 10 %. Skala nyeri didapatkan pada saat pulang tidak ada masalah sebanyak 10%, masalah sedikit 83%, dan masalah sedang 7%. Skala kecemasan / depresi didapatkan pada saat pulang tidak ada masalah sebanyak 52%, sedikit masalah 45%, dan masalah sedang 3%. Skala intelektual didapatkan pada saat pulang tidak ada masalah sebanyak 74%, sedikit masalah 23%, dan masalah sedang 3%.

Kesimpulan : Kuesioner Euroqol EQ-5D merupakan instrumen yang mudah dimengerti, tidak membutuhkan biaya banyak serta dapat diterapkan di berbagai bidang ilmu. Terdapat perbaikan pada semua skala dimensi Euroqol EQ-5D pada akhir pemantauan.

Kata kunci : *euroqol EQ-5D*, trauma kepala, bedah saraf bandung, rumah sakit hasan sadikin
(ISSN 2723-7494 J Bedah Indonesia. 2020;48:32-48)

Korespondensi penulis:

Eldy Muhammad Noor
Departemen Bedah, Universitas Padjadjaran, Bandung
Jalan Pasteur no. 38, Pasteur, Sukajadi, Bandung
Email : eldynoor@gmail.com

ARTIKEL PENELITIAN

Description of Patient's Post Trauma Life Quality in Moderate and Severe Head Injury with Intracranial Lesions using EUROQOL Group EQ-5D-5L Parameters In Department Of Neurosurgery Hasan Sadikin Hospital Bandung

Eldy Muhammad Noor¹, M. Zafrullah Arifin², Agung Budi Sutiyono²

¹ Surgery Department, Universitas Padjadjaran, Bandung

² Neurosurgery Division, Neurosurgery Department, Universitas Padjadjaran, Bandung

Abstract

Background: Head injury is one of the main causes of death in motor vehicle users in developing countries. The mortality rate of post-traumatic head patients during hospitalization is quite high. The literature on the quality of life of patients post traumatic brain injury (TBI) or neurological patients in developing countries is very limited data.

Objective: Assess the quality of life in moderate and severe head trauma patients with intracranial lesions at Hasan Sadikin Bandung Hospital using the EQ-5D-5L questionnaire.

Methods: This study used a prospective descriptive observational research design with a cross sectional study design, with subjects being neurosurgical patients entering the hospital emergency room. Hasan Sadikin Hospital Hand fulfilling the inclusion criteria will be performed an initial examination by a neurosurgeon, then proceed with filling in the F1 questionnaire, as long as the treatment will fill in F2, and before returning home to fill in F3, then follow up for months 1, 2, and 3 will fill in the F4 format. 1, F4.2 and F4.3. Samples were taken by consecutive sampling.

Result: There were 721 head trauma patients who entered the Emergency Department (IGD) of the neurosurgery section of Hasan Sadikin Hospital (RSHS) in the period August 1, 2018 up to January 31, 2019, found 22 (3.05%) people died in the emergency room, 23 people (3.2%) were forced to go home before being interviewed, and 36 patients (4.5%) were included in the inclusion criteria and participated in this study. Based on the dimensions of the EQ-5D mobilization when going home there were no problems of 35%, a slight problem of 62%, and a moderate problem of 3%. The scale of self-care is found without a problem of 10%, a slight problem of 87%, and a moderate problem of 3%. The usual scale of activities found without problem as much as 3%, a slight problem 87%, and a moderate problem 10%. The pain scale was obtained when returning home there were no problems as much as 10%, the problem was

ARTIKEL PENELITIAN

a little 83%, and the problem was 7%. Anxiety / depression scale was there were no problems as much as 52%, a slight problem 45%, and a moderate problem 3%. Intellectual scale was found there were no problems of 74%, a slight problem of 23%, and a moderate problem of 3%.

Conclusion: *There were improvements on all dimensions of the Euroqol EQ-5D at the end of monitoring.*

Keywords : *Euroqol eq-5d, head trauma, neurosurgery bandung, hasan sadikin hospital*

ARTIKEL PENELITIAN

Latar Belakang

The EuroQol Group adalah jaringan peneliti multidisiplin internasional yang memiliki tujuan untuk mengukur status kesehatan. Didirikan pada tahun 1987, *Grup EuroQol* awalnya terdiri dari para peneliti dari Eropa, tetapi saat ini mencakup anggota dari Amerika Utara dan Selatan, Asia, Afrika, Australia, dan Selandia Baru. Grup ini bertanggung jawab atas pengembangan EQ-5D, ukuran status kesehatan berdasarkan preferensi yang kini banyak digunakan dalam uji klinis, penelitian observasional, dan survei kesehatan lainnya.^{1,4}

Responden menjawab pertanyaan pada saat kondisi yang ideal untuk dilakukan wawancara. Wawancara bisa kita lakukan di poliklinik atau ruangan perawatan dengan cara bertatap muka langsung atau dilakukan melalui telepon.⁴

Penelitian ini dilakukan untuk menilai kualitas hidup pasien trauma kepala sedang dan berat dengan lesi intrakranial di bagian Bedah Saraf RS. Hasan Sadikin Bandung menggunakan kuisisioner EQ-5D-5L. Hasil penelitian akan dideskripsikan dalam bentuk grafik dan tabel.

Metode

Penelitian menggunakan desain penelitian observasional deskriptif prospektif, dengan subjek penelitian pasien bedah saraf yang masuk ke ruang gawat darurat RS. Hasan Sadikin dan memenuhi kriteria inklusi. Dilakukan pemeriksaan awal oleh dokter bedah saraf dan dilakukan pemeriksaan CT-Scan, kemudian dilanjutkan dengan mengisi kuisisioner F1, selama perawatan akan mengisi F2, dan sebelum pulang mengisi F3, selanjutnya *follow-up* selama bulan 1, 2, dan 3 akan mengisi format F4.1, F4.2 dan F4.3. Sampel diambil dengan cara *Consecutive Sampling*.

Kriteria inklusi: (1) Berumur ≥ 18 tahun, (2) GCS ketika masuk IGD RSHS ≤ 13 , (3) Diagnosa pasien fraktur kompresi dengan lesi intrakranial, perdarahan epidural, perdarahan subdural, perdarahan intraserebral traumatik, perdarahan intraventrikular traumatik, dan pneumocephalus yang dilakukan tindakan operasi emergensi, (4) Dirawat di bagian Ilmu Bedah Saraf RS. Hasan Sadikin Bandung, (5) Subjek bersedia berpartisipasi dalam penelitian dengan menandatangani persetujuan.

Kriteria eksklusi : (1) Pasien dengan riwayat penyakit stroke, (2) Pasien dengan

ARTIKEL PENELITIAN

riwayat konsumsi obat-obatan pengencer darah, (3) Pasien dengan trauma multiple, (4) Pasien tidak bisa di wawancara dan keluarga yang menemani tidak mengetahui informasi mengenai pasien yang dibutuhkan dalam kuisisioner, (5) Pasien tidak setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini.

Hasil

Dari 721 pasien trauma kepala yang masuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) bagian bedah saraf Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) pada periode 1 Agustus 2018 sampai dengan 31 Januari 2019, didapatkan 22 (3,05 %) orang meninggal di IGD, 23 orang (3,2 %) pulang paksa sebelum dilakukan interview, dan diperoleh 36 pasien (4,5 %) yang masuk kriteria inklusi dan ikut dalam penelitian ini.

Rata-rata usia dari 36 pasien yang ikut dalam penelitian ini adalah adalah berusia 38 tahun (18-65 tahun) dan 94 % diantaranya adalah pria. Pasien trauma kepala yang masuk ke IGD RSHS yang disebabkan kecelakaan lalu lintas adalah sebanyak 88% dan jatuh dari ketinggian adalah sebanyak 12% (**Tabel 4.1**).

Kesadaran saat masuk dihitung dengan menggunakan GCS dan didapatkan

cedera kepala sedang 88% dan berat 12%. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan CT Scan kepala untuk menentukan jenis cedera kepala. Sebanyak 52% pasien mengalami jenis cedera kepala lebih dari 1 lesi misalnya perdarahan epidural dan perdarahan subdural, perdarahan epidural dan perdarahan intraventrikel dan lain-lain. Kelompok ini merupakan kelompok terbanyak dibandingkan pasien yang hanya mengalami 1 jenis lesi seperti perdarahan epidural yaitu sebanyak 42% dan perdarahan subdural sebanyak 6% (**Tabel 4.3**).

Kelompok yang mengalami cedera lebih dari 1 lesi tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan prognosis dan kualitas hidup yang lebih buruk. Pada saat datang, kesadaran pada pasien yang dinilai menggunakan GCS pada kelompok cedera kepala kombinasi menunjukkan lebih banyak cedera kepala berat dibanding dengan kelompok yang mengalami 1 jenis cedera, yaitu sebanyak 9% mempunyai GCS kurang dari 8 dibandingkan kelompok perdarahan epidural yang memiliki 3% saja pasien dengan GCS kurang dari 8.

ARTIKEL PENELITIAN

Pembahasan

Berdasarkan penelitian ini didapatkan bahwa pada pasien trauma kepala dengan cedera kepala sedang dan berat yang masuk bagian bedah saraf RSHS pada umumnya disebabkan oleh kecelakaan lalu-lintas dan didominasi oleh pria. Trauma yang disebabkan oleh kecelakaan lalu-lintas merupakan fenomena yang sering terjadi, terutama di negara berkembang.²¹ Trauma merupakan urutan ke-7 penyebab kematian di India dan 78% disebabkan oleh kecelakaan lalu-lintas, sementara itu di Cina dilaporkan hal ini menempati urutan ke 5 pada populasi usia kurang dari 40 tahun, 61% diantaranya disebabkan karena kecelakaan lalu-lintas.²²

Pada umumnya pasien memiliki telepon genggam, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan *follow-up* wawancara setelah pasien pulang ke rumah. Penelitian ini pun menunjukan efektifitas biaya, dimana biaya pulsa yang digunakan tidak terlalu mahal untuk melakukan follow up pada pasien trauma kepala.²⁸ Di Amerika Serikat, follow up pasien pasca trauma kepala telah memperbaiki hasil dan status fungsional kualitas hidup pasien.²⁹ Namun hal ini belum dapat dibuktikan secara baik dalam penelitian ini,

dikarenakan sarana dan prasarana yang berbeda di setiap daerah dapat mempengaruhi standardisasi intervensi pengobatan pasca perawatan.³⁰ Kesulitan standarisasi ini merupakan masalah lain yang telah dilaporkan pada studi lainnya.²⁸ Dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa penggunaan telepon untuk mengikuti perkembangan kondisi pasien pasca trauma kepala dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien pasca perawatan di rumah sakit.

Kelemahan dan kekurangan penelitian ini adalah saat pasien dilakukan wawancara, subjektivitas pasien cukup tinggi dan harus dijelaskan bahwa yang dijawab oleh pasien harus benar-benar yang dirasakan dan dialami oleh pasien sesuai yang diharapkan oleh peneliti, tidak semua pasien memiliki telepon genggam yang sudah tersedia fasilitas video call, sehingga peneliti sulit untuk melihat secara langsung perkembangan pasien.

Hasil ini dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dalam hal dokumentasi pasien, perbaikan sarana dan prasarana kesehatan terutama bagian bedah saraf, dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup pasien trauma kepala di Indonesia pasca perawatan di rumah sakit.

ARTIKEL PENELITIAN

Kesimpulan

(1) Kuesioner Euroqol EQ-5D merupakan instrumen yang mudah dimengerti dan membutuhkan biaya yang tidak terlalu banyak serta dapat diterapkan di berbagai bidang ilmu. (2) Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat perbaikan pada semua skala dimensi Euroqol EQ-5D pada akhir pemantauan. (3) Pasien yang masih terdapat masalah pada bulan ketiga pengamatan merupakan pasien dengan jenis lesi lebih dari 1 macam dengan lama tunggu operasi lebih dari 6 jam yang merupakan faktor resiko yang memperburuk prognosis pasien pasca trauma kepala.

Saran

Penelitian dilanjutkan dengan mengambil sampel yang lebih banyak dan dilakukan di lebih dari satu rumah sakit. (*Multicenter*)

Daftar Pustaka

1. Courtney MT, Beauchamp RD, Evers B, Mattox KL. Sabiston Textbook Of Surgery : The Biological Basis Of Modern Surgical Practise. Nineteen Edition. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2012. hlm. 439-441
2. Zamzami NM, Fuadi I, Nawawi M. Angka Kejadian dan Outcome Cedera Otak di RS. Hasan Sadikin Bandung Tahun 2008-2010. Jurnal Neuroanestesia Indonesia; 2013. hlm. 89-92
3. Arifin MZ, Tjahjadi IM, Faried A, Sutiono AB. Atlas Operasi Ilmu Bedah Saraf : Perdarahan Epidural dan Fraktur Kompresi Tengkorak. Departemen Ilmu Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin. Bandung; 2012. hlm. 2, 43-47, 90-93
4. Sutiono AB, Faried A, McAllister S, Arifin MZ et al. The Bandung neurosurgery patient outcomes project, Indonesia (Part II): Patient pathways and feasibility and acceptability of telephone follow-up. Int J Health Plann Mgmt. 2017. <https://doi.org/10.1002/hpm.2406>
5. Astuti E, Saanin S, Edison. Hubungan Glasgow Coma Scale Dengan Glasgow Outcome Scale Berdasarkan Lama Waktu Tunggu Operasi Pada Pasien Perdarahan Epidural. Majalah Kedokteran

ARTIKEL PENELITIAN

- Andalas. Volume 39. No.2; 2016, hlm. 50-57
6. Baheram L. Cedera Kepala Pada Pejalan Kaki Dalam Kecelakaan Lalu-lintas Yang Fatal. *Majalah Kedokteran Bandung*; 2007, 26 (2). hlm 52-54
7. Kavalci C, Aksel G, Salt O, M. Yilmaz S, Demir A, Kavalci G, et al. Comparison of the Canadian CT head rule and the new orleans criteria in patients with minor head injury. *World Journal of Emergency Surgery*; 2014. 9:31. hlm. 3
8. World Health Organization. Violence and Injury Prevention and Disability (VIP) : Neurotrauma; 2018. (diunduh tgl 28 Maret 2018)
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road-traffic/activities/neurotrauma/en/
9. McNett MM, Amato S, Philippbar SA. A Comparative Study of Glasgow Coma Scale and Full Outline of Unresponsiveness Scores for Predicting Long-Term Outcome After Brain Injury. Philadelphia. American Association of Neuroscience Nurses; 2016. hlm. 208
10. Hansen B, Quick J, Sinkovits E, Smith JC. Glasgow Coma Scale : How To Improve And Enhance Documentation. *Jurnal Of Trauma Nursing*; 2014. 21:3. hlm.123
11. Japardi I. Cedera Kepala : Memahami Aspek-aspek Penting Dalam Pengelolaan Cedera Kepala. PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta; 2004. hlm. 7-10
12. Tortora GJ, Nielsen MT. Principles Of Human Anatomy. Edisi 12. Amerika Serikat. Biological Science Textbook, inc; 2012. hlm. 628
13. Lisle DA, Russell A. Imaging For Student. Inggris. Hodder Headline Group; 2001. Hlm. 206-211
14. Greenberg MS. Handbook Of Neurosurgery. Eighth edition. New York. Thieme Medical Publishers, Inc; 2016. hlm.892
15. Mattox KL, Moore EE, Feliciano DV. Trauma. Edisi 7. The McGraw-Hill Companies. Amerika Serikat; 2013. hlm. 361
16. Szende A., Janssen B., Cabases J. Self-Reported Population Health: An International Perspective based on EQ-5D. Springer; 2014

ARTIKEL PENELITIAN

17. Reenen MV, Janssen B. EQ-5D-5L User Guide : Basic Information On How To Use The EQ-5D-5L Instrument. Euroqol Research Foundation. Netherland; 2015
18. World Health Organization. Health statistics and information systems; WHOQOL : Measuring Quality of Life; 2018. (diunduh 28 April 2018) <http://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/>
19. Romain B., Rohmer O., Schimchowitsch , Hübner M., Delhorme JB., Brigand C., Rohr S. and Guenot D. Influence of preoperative life satisfaction on recovery and outcomes after colorectal cancer surgery - a prospective pilot study. Health and Life Quality Outcomes. BioMed Central. Prancis; 2018. hlm. 16
20. Greenwald BD., Ambrose AF., Amstrong GP. Editorial Mild Brain Injury. Hindawi Publishing Corporation Rehabilitation Research and Practice; 2012. Article ID 469475. hlm 1-3
21. Hyder, AA., Wunderlich, P., Puvanachandra, G. Gururaj and Kobusingye. The Impact Of Traumatic Brain Injuries : A Global Perspective. Neuro Rehabilitation; 2007. hlm. 341-353.
22. Puvachandra P., Hyder AA. The Burden Of Traumatic Brain Injury In Asia : A Call Of Research. Pak J Neurol SCI; 2009. hlm. 27-32
23. Wu JJ., Hsu CC., Liao SY., Wong YK. Surgical Outcome Of Traumatic Intracranial Hematoma at a Regional Hospital in Taiwan. Journal Of Trauma and Acute Care Surgery; 1999. hlm. 39-43
24. Bahloul M., Chelly H., Ben Hmida M., Ksibi H., Kallel H., Chaari A., Kassis M., Rekik N., Bouaziz M. Prognosis Of Traumatic Head Injury in South Tunisia : A Multivariate Analysis Of 437 Cases. Journal Of Truma and Acute Care Surgery; 2004. hlm. 255-261
25. Kim TH., Jo MW., Lee SI., Kim H., Chung SM. Psychometric Properties Pf The Euroqol EQ-5D-5L In The General Population Of South Korea. Quality Of Life Research; 2013. hlm. 2245-2253
26. Abidin E., Subramaniam M., Vaingankar JA., Luo N., Chong SA. Measuring Health-related Quality Of Life Among Adult In Singapore: Population Norms For The EQ-5D.

ARTIKEL PENELITIAN

- Quality Of Life Research; 2013. hlm. 2983-2991
27. Sun SJ., Chen JJ., Johanneson M., Kind P., Xu L., Zhang Y., Burstrom K. Population Health Status In China: EQ-5D Result, by age, sex and socio-economic status, From The National Health Services Survey. Quality Of Life Research; 2008. hlm.81-84
28. Mistiaen P. and Pot E. Telephone Follow Up, Initiated By A Hospital Based Health Profesional, For Postdischarge Problems In Patient Discharge From Hospital To Home. Cochrane Database Of Systematic Reviews; 2006. hlm. 4
29. Bell KR., Temkin NR., Esselman PC., Doctor JN., Fraser TR., Hoffman JM., Powel JM., Dikmen SS. The Effect Of A Scheduled Telephone Intervention On Outcome After Moderate To Severe Traumatic Brain Injury: A Randomized Trial. Archives Of Physical Medicine and Rehabilitation; 2005. hlm. 851-856
30. Bell KR., Brockway JA., Hart J., Whyte J., Sherer M., Fraser RT., Remkin NR., Dikmen SS. Scheduled Telephone Intervention For Traumatic Brain Injury: A Multicenter Randomized Controlled Trial. Archieves Of Physical Medicine and Rehabilitation; 2011. hlm. 1552-1560

ARTIKEL PENELITIAN

Tabel dan Gambar

Tabel 4.1. Karakteristik pasien masuk RSHS

Karakteristik	n (%)
Total n=36	
Jenis Kelamin	
Pria	34 (94)
Wanita	2 (6)
Usia : rata-rata; SD (range)	38 (18-65)
Kelompok usia	
18-30	13 (36)
31-40	11 (31)
41-50	2 (6)
51-60	6 (16)
60+	4 (11)
Alasan masuk RS	
Kecelakaan lalu-lintas	31 (86)
Jatuh dari ketinggian	5 (14)

Tabel 4.2. Karakteristik Sosiodemografi

Karakteristik Sosiodemografi	n (%)
Total n=36	
Pendidikan	
Lulus Sekolah dasar atau <	1 (3)
Lulus SMP	7 (19)
Lulus SMA	26 (72)
Lulus Universitas atau setara	2 (6)
Pekerjaan	
Karyawan	1 (3)
Wiraswasta	15 (41)
Tidak bekerja (termasuk siswa)	13 (36)
IRT / Suami / Pensiunan	7 (20)
Menikah, Ya	24 (66)
Tempat tinggal	
Rumah sendiri	15 (42)
Rumah orangtua	21 (58)
Rumah keluarga atau lainnya	0
Jumlah anggota keluarga	
1 s/d 4	13 (36)
5+	23 (64)
Asuransi kesehatan, Ya	33 (94)

ARTIKEL PENELITIAN

Tabel 4.3. Karakteristik GCS dan Hasil CT Scan Kepala

Jenis Cidera Kepala	n (%) n=36
GCS	
<i>Moderate Head Injury</i> (GCS 9-13)	32 (88)
<i>Severe Head Injury</i> (GCS $\leq$ 8)	4 (12)
CT Scan Kepala	
Fraktur kompresi	
Perdarahan epidural	15 (42)
Perdarahan subdural	2 (6)
Perdarahan intraserebral	
Perdarahan intraventikular	
Pneumocephalus	
Kombinasi	19 (52)

Tabel 4.4. Karakteristik GCS datang dan pada saat pulang

GCS Datang	GCS Pulang	
	Mild n (%)	Meninggal n (%)
Perdarahan Epidural		
Moderate	14 (39)	
Severe	1 (3)	
Perdarahan Subdural		
Moderate	1 (3)	1 (3)
Severe		
Kombinasi		
Moderate	14 (39)	2 (5)
Severe	1 (3)	2 (5)

ARTIKEL PENELITIAN

Tabel 4.9. Karakteristik pasien masuk sebelum interview pulang

Karakteristik	n (%)
Total n= 36	
Cara Masuk RS	
Datang sendiri tanpa rujukan dengan mobil pribadi	2 (6)
Dirujuk dari rumah sakit lain dengan ambulans	18 (50)
Dirujuk dari rumah sakit lain dengan mobil pribadi	16 (44)
Tenaga kesehatan yang ditemui pertama kali	
Staf medis emergency	3 (8)
Dokter swasta	1(3)
Puskesmas	22(61)
Lain-lain (bidan, dokter spesialis lain)	10 (28)
Waktu yang dibutuhkan dari kejadian ke fasilitas kesehatan	
< 24 jam	36 (100)
24 - 48 jam	0
>48 jam	0

Tabel 4.10. Karakteristik pasien pulang setelah dilakukan interview

Karakteristik	n (%)
Total n= 31	
Tempat pulang pasca perawatan	
Rumah orang tua	21 (58)
Rumah sendiri	15 (42)
Waktu yang diperlukan dari rumah ke RSHS	
0 – 2 jam	12 (40)
2 – 4 jam	11 (35)
4 - 6 jam	6 (19)
> 6 jam	2 (6)
Waktu yang dibutuhkan dari rumah ke fasilitas kesehatan terdekat	
< 30 menit	27 (87)
30– 60 menit	3 (10)
> 60 menit	1 (3)

ARTIKEL PENELITIAN

Skala Dimensi EQ-5D

Keterangan : F3 (pada saat pasien pulang), F 4.1 (Pemantauan bulan pertama), F 4.2 (Pemantauan bulan kedua), F 4.3 (Pemantauan bulan ketiga)

Keterangan : F3 (pada saat pasien pulang), F 4.1 (Pemantauan bulan pertama), F 4.2 (Pemantauan bulan kedua), F 4.3 (Pemantauan bulan ketiga)

ARTIKEL PENELITIAN

Keterangan : F3 (pada saat pasien pulang), F 4.1 (Pemantauan bulan pertama), F 4.2 (Pemantauan bulan kedua), F 4.3 (Pemantauan bulan ketiga)

Keterangan : F3 (pada saat pasien pulang), F 4.1 (Pemantauan bulan pertama), F 4.2 (Pemantauan bulan kedua), F 4.3 (Pemantauan bulan ketiga)

Keterangan : F3 (pada saat pasien pulang), F 4.1 (Pemantauan bulan pertama), F 4.2 (Pemantauan bulan kedua), F 4.3 (Pemantauan bulan ketiga)

ARTIKEL PENELITIAN

Keterangan : F3 (pada saat pasien pulang), F 4.1 (Pemantauan bulan pertama), F 4.2 (Pemantauan bulan kedua), F 4.3 (Pemantauan bulan ketiga)

ARTIKEL PENELITIAN

Role of Autologous Fibrine Glue to Decrease Seroma Volume On 14th Post Operative Day in Carcinoma Mamae Patients that Underwent Simple Mastectomy

Ahmad Iffa Maududy¹, Kiki Ahmad Rizki², Raden Yohana², Nadjwa Jamalek D³

¹Department of Surgery, Hasan Sadikin Hospital, Faculty of Medicine, Padjadjaran University, Bandung, Indonesia

²Sub-Division of Oncology Surgery, Department of Surgery, Dr.Hasan Sadikin Hospital, Faculty of Medicine, Padjadjaran University, Bandung, Indonesia

³Departemen of pathology Anatomy, Dr.Hasan Sadikin Hospital, Faculty of Medicine, Padjadjaran University, Bandung, Indonesia

Abstrak

Background. Seroma is the most significant complication that occurred after mastectomy, happen in 25% until 60% cases. Seroma are not life threatening complications, but can lead to serious morbidity, prolonged hospital stay and delay adjuvant therapy. Autologous Fibrin Glue is a hemostatic agent that can accelerate fibrin thread formation, stop vascular oozing and decrease dead space. This research was performed to evaluate Autologous Fibrin Glue function in lowering seroma volume at 14th days after simple mastectomy.

Methods. This research is a clinical trial to compare average seroma volume between advance stage locally breast carcinoma patients group which are given Autologous Fibrin Glue on the surface of surgical wound, 14 days after simple mastectomy (trial group) and control group (without special treatment) with ultrasonography.

Result. From 42 patients who met the inclusion criteria, divided into 2 groups, 21 patients were given Autologous Fibrin Glue on the surgical wound surface in a simple mastectomy procedure, 21 patients as a control group. The number of seromas in the treatment group was measured using ultrasound on the 14th day, fewer meaningfully than the control group, the median seroma volume in the treatment group was 9,30 mL and median seroma volume in the control group was 20.90 mL. The P value in the variable number of seroma is smaller than 0.05 (P. < 0.05) which means significant, the number of seromas measured using ultrasonography (USG) on the 14th day, fewer meaningfully in the treatment group.

Conclusion. Subjects that was given Autologous Fibrin Glue on the surface of surgical wound after simple mastectomy has a lower volume of seroma compared to control group.

ARTIKEL PENELITIAN

Keywords: Autologous Fibrin Glue, seroma, simple mastectomy

(ISSN 2723-7494 J Bedah Indonesia. 2020;49:49-67)

Author Correspondence:

Ahmad Iffa Maududy

Department of Surgery, Hasan Sadikin Hospital, Faculty of Medicine, Padjadjaran University, Bandung,
Indonesia Jalan Pasteur no. 38, Pasteur, Sukajadi, Bandung

Email : Iffa.dr@gmail.com

ARTIKEL PENELITIAN

Introduction

Breast cancer is the second leading cause of death in the United States, with an incidence of about 210,000 new cases and causing more than 40,000 deaths each year. Operative management for breast cancer are divided into breast-conserving therapy and mastectomy with or without axillary lymph node dissection depending on the stage of the disease.^{1,2}

Seroma formation is an after surgery complication that most often occurs after mastectomy, with an incidence of 3% to 50%³ according to research conducted by Junior in 2010 at the Sub Division of Oncology Surgery Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung, the incidence of seroma after mastectomy was 62.5%.⁷ Although seroma is not a life-threatening complication, it can lead to skin flap necrosis, pain, infection, delayed wound healing, reopening of the surgical wound, predisposing to sepsis, and lymphedema. In addition, excessive fluid collection will stretch the skin so that it becomes saggy and cause discomfort to the patient.^{2,4,5} These things can interfere with the healing process, prolong in hospital stay^{8,11} and delay the provision of further therapy.^{7,9} Fibrin glue has been used in surgical procedures for more than 30 years.

Fibrin glue as a hemostatic and tissue adhesion agent has evolved in a variety of surgical procedures, including heart, eye, blood vessel, liver, prostate, thoracic, cosmetic, orthopedic and gynecological surgery.¹⁶ Numerous studies have shown fibrin glue can help prevent seroma formation in animal mastectomy,¹⁷⁻¹⁹ these underlie the use of fibrin glue in humans. By increasing hemostasis and tissue adhesion, fibrin glue theoretically could prevent seroma formation by reducing the accumulation of seroma fluid after surgery, which occurs as a result of inflammation and transection of several small and lymphatic vessels during removal of the breast and axillary lymph nodes.¹³

Allogeneic material in commercial fibrin glue is expensive in the manufacturing process, it can also cause allergic reactions so that clinicians have begun to switch to using materials derived from the patient own blood and are cheaper in the manufacturing process but have a similar effect, namely Autologous Fibrin Glue²² is believed to have several advantages over commercial fibrin glues which are much more expensive. Autologous Fibrin Glue is taken from the patient own blood, to be used topically, safe from infectious diseases, and does not cause

ARTIKEL PENELITIAN

allergic reactions such as bovine thrombin contained in commercial fibrin glue.^{22,25}

The Making process of Autologous Fibrin Glue has been carried out by the Department of Clinical Pathology, Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung, Faculty of Medicine, Padjadjaran University.^{1,4}

Based on previous theory and research, the researcher will conduct research on giving Autologous Fibrin Glue after mastectomy surgery on the basis of surgical wounds, to see the effect of reducing seroma formation measured after the acute phase of wound healing is estimated to end on day 14.

Method

Experimental study design and was conducted in a single blind randomized controlled trial in both groups, the locally advanced breast carcinoma group that was given Autologous Fibrin Glue topically on the wound surface after simple mastectomy surgery and the control group without special treatment with 5 days of treatment. After surgery, the control group patient on day 7th went to the oncology surgical clinic and assessed whether there were any exclusion criteria for the patient, namely the state of the surgical wound. On 14th day, control patient undergo an ultrasound

examination of the surgical wound area performed by 1 person equal to the level of Chief Resident under the supervision of the ultrasonography consultant. The data obtained were recorded in a special form and then processed through the SPSS version 24.0 for Windows program.

Result

The number of research subjects for each group amounted to 20 people so that the total subjects in this study were 40 people. In this study, 10% of patients were excluded, 4 patients out of 44 patients due to flap necrosis and intact wounds due to infection. This has met the minimum required sample size. Research subjects were grouped into 2 groups, namely: the control group and the treatment group. The control group is a group of patients with breast carcinoma who underwent simple mastectomy and were not given special treatment. The treatment group was a group of patients with breast carcinoma who underwent a simple mastectomy and then given 4cc topical Autologous Fibrin Glue on the surface of the surgical wound. Then the two groups of research subjects performed surgical wound closure with layer by layer stitches. The characteristics

ARTIKEL PENELITIAN

of research subjects in general can be seen in (Table 4.1). Table 4.1 describes the characteristics of research subjects based on age, weight, height, body mass index and chest circumference.

The overall average age of the study subjects was $47.35 \pm 10,329$ years, the average overall body weight of the study subjects was $56.03 \pm 8,248$ kg. The overall mean height of the research subjects was 1.56 ± 0.047 meters, and the overall mean BMI of the study subjects was 23.13 ± 3.205 . The average chest circumference of research subjects was $85.03 \pm 15,129$ cm.

For this numerical data analysis, unpaired T-test is used if the data is normally distributed, namely Height, BMI and Chest Circumference, as well as an alternative to the Mann-Whitney test if the data is not normally distributed, namely Age and Weight. Test results statistics on research subjects obtained P-value information on variable Age, Weight, Height, BMI and Chest greater than 0.05 ($P \text{ value} > 0.05$) which means insignificant or insignificant statistically, it can be explained that there is no mean statistically significant difference between the variables Age, Weight, Height, BMI and Chest in the Autologous Fibrin Glue group with the Control Group.

Based on characteristics comparison between two groups, it can be concluded that the two groups are the same or homogeneous so that it is feasible to be compared and further statistical hypothesis testing is carried out.

In treatment groups, the mean hemoglobin level was $11.39 \pm 1,577$ g / dL, mean PT was 11.33 ± 1.292 seconds, the mean APTT was $27.61 \pm 3,700$ seconds, the mean INR was 0.90 ± 0.053 . While the mean platelet count was 283.45 ± 79.607 / uL, the mean fibrinogen level was 399.47 ± 117.650 mg / dL and the average albumin level was 3.38 ± 0.463 g / dL.

In the control group, the mean hemoglobin level was 11.14 ± 1.628 g / dL, the mean PT was 12.55 ± 2.397 seconds, the mean APTT was 28.09 ± 4.603 seconds, the mean INR was 0.92 ± 0.076 . While the average platelet count was $251.55 \pm 108,965$ / uL, the mean fibrinogen level was 375.71 ± 47.190 mg / dL and the average albumin level was 3.35 ± 0.395 g / dL.

For this numerical data analysis, it was tested using an unpaired T-test if the data were normally distributed, namely Hemoglobin, APTT, Fibrinogen and Albumin and the alternative Mann Whitney test if the data were not normally

ARTIKEL PENELITIAN

distributed, namely PT, INR and the number of platelets.

In the Treatment group, the median number of seromas examined using ultrasound on day 14 was 9.30 mL. Whereas in the control group, the median number of seromas examined using ultrasound on day 14 was 20.90 mL.

This numeric data tested using *Mann-Whitney test* because the data is not normally distributed. Results of statistical tests in the research group above obtained a P value on variable Seroma number less than 0.05 (P value <0.05) which means significant.

Thus, it can be concluded that the number of seromas measured using ultrasound on day 14 was significantly less in the group receiving Autologous Fibrin Glue compared to the control group.

Discussion

This study involved 42 research subjects who met the inclusion criteria. The research subjects were then divided into 2 groups, namely a control group of 21 subjects, who did not receive special treatment and a treatment group of 21 subjects who received 4 cc of topical

Autologous Fibrin Glue on the surface of the surgical wound.

P value obtained from (**Table 4.3**) ($p > 0.05$) it can be concluded that the variables of hemoglobin levels, PT, APTT, INR, platelet counts, fibrinogen levels and albumin levels in the treatment and control groups were not significantly different.

Result of the statistical calculations from (**Table 4.2**) show that the two groups were homogeneous based on BMI, so there is no bias caused by obesity as one of the factors affecting seroma production, and hypoalbumin (**Table 4.3**) as a factor that can inhibit wound healing. As suggested by Karakaya et al⁹, obesity has a direct relationship to the number of seromas. Another study, from Barnejee et al.⁴³ where there is a linear relationship between BMI addition and seroma production.

(**Table 4.4**) points out rightly that seroma count in the treatment group which was measured using ultrasound at day 14, was significantly less compared to the control group, where in the median total seroma volume on day 14 in the treatment group was 9.30 ml, and the median in the control group was 20.90 ml. P value in the seroma variable amount less than 0.05 (P value <0.05) which means significant. Thus number of seromas measured using USG on

ARTIKEL PENELITIAN

day 14 was significantly less in the treatment group.

This result is in line with a study conducted by Mahmood Reza et al., 2012¹⁸ which sprayed 4 cc commercial fibrin glue on the wound bed of patients after mastectomy, where the result was that 16% formed seromas in the treatment group and 24% in the control group.

The systematic review and meta-analysis conducted by Carless, 2006²⁵ showed that no significant differences were found between patients who were given fibrin glue and patients who were not given fibrin glue. There are several factors that influence this, namely the heterogeneity of the research patients carried out, the inadequacy of research methods such as varying the volume of fibrin glue given ranging from 2 ml - 24 ml, varying types of breast surgeries performed such as modified radical mastectomy, lumpectomy, axillary lymph node dissection, segmental mastectomy and total mastectomy.

The same thing was explained in research by Lyneette, 2005²¹ who gave fibrin glue to post mastectomy patients, the result did not show a significant difference to patients who were not given fibrin glue. In this study, the cause of the absence of significance was known because various

methods were used in the mastectomy technique. Of the 82 participants, 10 participants (12.2%) underwent a simple mastectomy alone, 22 participants (26.8%) underwent simple mastectomy simultaneously with axillary lymph node dissection or sentinel lymph node biopsy, 25 participants (30.5%) underwent surgery breast conservation, 23 participants (28.1%) underwent modified radical mastectomy, and 2 participants (2.4%) underwent nodule dissection, this causes bias in the form of heterogeneity of research methods. In addition, this study compared patients who were given fibrin glue without drainage and patients who were not given fibrin glue but used drain. Therefore, in this study, although fibrin glue tended to have more seromas.

Limitation of this study is the study subjects were only patients who underwent a simple mastectomy, whereas based on the study from Kuroi et al.¹⁵ one of the main risk factors for seroma formation was the radicality of surgery and axillary lymph node dissection, due to the amount of lymphovascular leakage and oozing of small blood vessels from the procedure..

In this research the patient response to chemotherapy must be measured and grouped because the residual tumor is

ARTIKEL PENELITIAN

attached to the muscle tissue so that the border of the incision is not tumor-free which will affect the number of seromas. In this study, the amount of Aquabides liquid used when washing the base of the surgical wound was not equalized in order to reduce bias for surgery. This study was also not accompanied by data on how to treat wounds and dressings patient wound and data on the type of antibiotic consumed by the patient.

Conclusion

Applying Autologous Fibrin Glue to the surface of the surgical wound can reduce the number of seromas in simple mastectomy patients.

Acknowledgments

Department of Surgery, Dr.Hasan Sadikin Hospital, Faculty of Medicine, Padjadjaran University, Bandung, Indonesia

Financial Support

There is no financial support

Conflict of Interest

None

References

1. Sanjitha S, Gabriel R, Seroma Formation after Mastectomy : *Pathogenesis and Prevention*, Indian Journal of Surgical Oncology, 2010 1(4) : 328-333
2. Kuroi K, Shimoizuma K, Taguchi T, Imai H, Yamashiro H, Oshumi S et al, *Evidence-based Risk Factor for Seroma Formation in Breast Surgery*, Japan Journal Clinical Oncology, 2006, 36(4) : 197-206.
3. Lumachi F, Brandes AA, Burelli P, Basso SM, Iacobone M, Ermani M. Seroma prevention following axillary dissection in patients with breast cancer by using ultrasound scissors: a prospective clinical study. *Eur J Surg Oncol* 2004; 30: 526–530.
4. Hashemi E, Kaviani A, Najafi M, Ebrahimi M, Hooshmand H, Montazeri A, *Seroma Formation After Surgery of Breast Cancer*, World Journal of Surgical Oncology, 2004(2) : 44.

ARTIKEL PENELITIAN

5. Stanczyk M, Grala B, Zwierowics T, Maruszynski M, *Surgical Resection for Persistent Seroma, Following Modified Radical Mastectomy*, World Journal of Surgical Oncology, 2007(5) : 104.
6. Karakaya M, Karaman N, özazlan C, Kurukahvecioglu O, Bircan HY, Altinok M, *Wound Complication Following Breast Cancer Surgery*, The Journal of Breast Health, 2006, pp. 085-088.
7. Junior N. O, *Hubungan antara Seroma dengan Body Mass Index dan Kadar Lekosit Cairan Seroma*. Bedah Onkologi, Disertasi Program Pendidikan Spesialis-2 Bedah Onkologi, Bandung. 2010.
8. Gonzalez EA, Saltzstein EC, Riedner CS, Nelson BK. Seroma formation following breast cancer surgery. Breast J.2003; 9: 385–388.
9. Pogson CJ, Adwani A, Ebbs SR. Seroma following breast cancer surgery. Eur J Surg Oncol 2003; 29: 711–717.
10. Moore MM, Freeman MG. Fibrin sealant in breast surgery. J Long Term EffMed Implants 1998; 8: 133–142.
11. Burak WE, Jr., Goodman PS, Young DC, FarrarWB. Seroma formation following axillary dissection for breast cancer: risk factors and lack of influence of bovine thrombin. J Surg Oncol 1997; 64: 27–31.
12. Huseyin O. A, *Seroma Cytology in Breast Cancer*, Clinical Breast Cancer, Vol 16, No 6, 2016
13. Loo W, Chow L, *Factor Predicting Seroma Formation After Mastectomy for Chinese Breast Cancer Patients*, Indian Journal of Cancer, 2007, (44)5.
14. Huseyin O. A, *Seroma Cytology in Breast Cancer*, Clinical Breast Cancer, Vol 16, No 6, 2016
15. Kuroi K, Shimozuma K, Taguchi t, Imai H, Yamashiro H, *Pathophysiology of Seroma in Breast Cancer*, Breast Cancer Journal , 2005, 12(4) : 288-293.
16. Sierra DH. Fibrin sealant adhesive systems: a review of their chemistry, material properties and clinical applications. Journal of Biomaterials Applications 1993; 7: 309–352.
17. LindseyWH, Masterson TM, Spotnitz WD, Wilhelm MC, Morgan

ARTIKEL PENELITIAN

- RF. Seroma prevention using fibrin glue in a rat mastectomy model. Arch Surg 1990; 125: 305–307.
18. Eroglu E, Oral S, Unal E, Kalayci M, Oksuz O, Tilmaz M. Reducing seroma formation with fibrin glue in an animal mastectomy model. Eur J Surg Oncol 1996; 22: 137–139.
19. Harada RN, Pressler VM, McNamara JJ. Fibrin glue reduces seroma formation in the rat after mastectomy. Surg Gynecol Obstet 1992; 175: 450–454.
20. Radosevich M, Goubran H.A, Burnouf T, Fibrin Sealant : *Scientific Rationale, Production Methods, Properties, and Current Clinical Use*, Vox Sanguinis, 1997;72:133-143
21. Lyneette J, Therese E, Stephen D, Helmer, *Influence of Fibrin Glue on Seroma Formation after Breast Surgery*, The American Journal of Surgery, 2005 : 319-323
22. Rifada M, Prawirakoesoema L, Dalimoenthe N.Z, Enus S, *Perbandingan Derajat Hiperemis Setelah Bedah Pterigium Inflamasi antara Teknik LFO dan Teknik Jahitan*, MKB, 2013 : vol.45, No.3
23. Mahmood R, *Efficacy of fibrin Glue on Seroma Formation after Breast Surgery*, International Jurnal Of Breast Cancer; Hindawi publishing, 2012
24. Radosevich M, Goubran H.A, Burnouf T, Fibrin Sealant : *Scientific Rationale, Production Methods, Properties, and Current Clinical Use*, Vox Sanguinis, 1997;72:133-143
25. Carless PA, Henry DA, *Systematic review and meta-analysis of the use of fibrin sealant to prevent seroma formation after breast cancer surgery*, British Journal of Surgery 2006; 93: 810–819.
26. Nadjwa Zamalek Dalimoenthe, *Pendekatan Diagnosis Pasien dengan Kelainan Perdarahan*, Bagian Patologi Klinik Universitas Padjadjaran/RSHS, 2015.
27. Mansjoer S, *Mekanisme Kerja Obat Anti Radang*, Bagian Farmasi FK-USU, USU Digital Library, 2003, pp.1-7.
28. Manuaba IBTjW, *Panduan Penatalaksanaan Kanker Solid* PERABOI, Sagung Seto, 2010, 17-32.

ARTIKEL PENELITIAN

29. Brunicardi FC, *The Breast in* : Schwartz's Principles of Surgery, 10th, The McGraw-Hill Companies, 2015, Chapter 17, pp.497-564.
30. Donegan WL, spratt JS, *Surgical Technique in : Cancer of the Breast*, 5th ed, Elsevier Science, 2002, pp.623-631
31. Zollinger RM, Ellison EC, *Zollinger's Atlas of Surgical Operations 9th ed*, McGraw-Hill Co, 2011, pp.428-433
32. J. van Bastelaar, R. Granzier. *A multicenter, double blind randomized controlled trial evaluating flap fixation after mastectomy using sutures or tissue glue versus conventional closure: protocol for the Seroma reduction After Mastectomy(SAM) trial* : 2018
33. Soomro SA, Husain N, Shaikh BA, Maher M, *Predicting Factor of Seroma Formation After Breast Cancer Surgery*, Pakistan Journal of Surgery, 2006, 22(issue 4) : 201-204.
34. özdoğan M, Yılmaz KB, özaslan C, Güreş A, Gülbahar ö, Ersoy E, *Scalpel Versus Electrocautery Dissection: The Effect on Wound Complication and Pro-inflammatory Cytokine Levels in Wound Fluid*, Turkey Journal of Medical Science, 2008, 38(2) : 111-116.
35. Banerjee D, Williams EV, Ilott J, Monypenny IJ, Webster DJT, *Obesity Predisposes to Increased Drainage Following Axillary Node Clearance : A Prospective Audit*, ann. Roy. Coll. Surg. England, 2001, 83 : 268-271.
36. Shiwaku K, Anuurad E, Enkhmaa B, Nogi A, Kitajima K, Shimono K et al, *Overweight Japanese with Body Mass Index of 23.0-24.9 have Higher Risk for Obesity-associated Disorder : A Comparison of Japanese and Mongolians*, International Journal of Obesity, 2004, 28 : 152-158.
37. Suryadi I A, Asmarajaya AAGN, Maliawan S, *Proses Penyembuhan dan Penanganan Luka*, tersedia dari : <http://www.ojs.unud.ac.id>, Diunduh pada tanggal 28 Juni 2016
38. Reny N M, Suega K. *Laporan Kasus Seorang Penderita Hemofilia Ringan dengan Perdarahan Masif*, Jurnal Penyakit Dalam, Vol 7, Unud, 2006.

ARTIKEL PENELITIAN

39. National Cancer Institute, Breast Cancer, tersedia dari : <http://www.cancer.gov>, Diunduh pada tanggal 28 Juni 2016.
40. Bullock J, Basu B, Hsu P, Singer R. *Revention of Hematomas and Seromas*, Semin Plast Surg, 2006, 20 : 233-240.
41. Spotnitz WD, Fibrin Sealant: *The Only Approved Hemostat, Sealant, and Adhesive - a Laboratory and Clinical Perspective*, ISRN Surgery ; 2014.
42. Takeshi Okuda. Novel surgical technique to solidify cyst-type metastatic brain tumors using autologous fibrin glue for complete resection, 2014,
43. Dicuio M, Pomara G, Fabris FM, Ales V, Dahlstrand C, Morelli G. *Measurements of urinary bladder volume: comparison of five ultrasound calculation methods in volunteers*. Arch Ital Urol Androl. 2005 Mar;77(1):60-2.
44. Kim SM, Park JM. Normal and abnormal US findings at the mastectomy site. Radiographics. 2004 Mar;24(2):357-65.
45. Coveney EC, O'Dwyer PJ, Geraghty JG, O'Higgins NJ. Effect of closing dead space on seroma formation after mastectomy – a prospective randomized clinical trial. Eur J Surg Oncol 1993; 19: 143–14
46. Komite penanggulangan kanker Nasional, Kementerian kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman penatalaksanaan kanker payudara*. 2018 : 37
47. Newman, Lisa F, *Complication of Breast Surgery : in Surgical Complication : Diagnosis and Treatment*, Imperial College Press, London, 2007, 169-178.

ARTIKEL PENELITIAN

Tables and Pictures

Table 4.1 Characteristics of Research Subjects

Variable	N = 40
Age (years)	
Mean $\pm$ Std	47.35 $\pm$ 10,329
Range (min-max)	26.00-84.00
Weight (Kg)	
Mean $\pm$ Std	56.03 $\pm$ 8,248
Range (min-max)	44.00-80.00
Height (m)	
Mean $\pm$ Std	1.56 $\pm$ 0.047
Range (min-max)	1.45-1.65
BMI (%)	
Mean $\pm$ Std	23.13 $\pm$ 3.205
Range (min-max)	17.60-33.30

ARTIKEL PENELITIAN

Chest diameter (cm)

Mean $\pm$ Std 85.03 $\pm$ 15.129

Range (min-max) 52.00-114.00

Note: Categorical data are presented with number / frequency and percentage, while numerical data are presented with mean, median, standard deviation and range.

ARTIKEL PENELITIAN

Table 4.2 Comparison between the Characteristics of the Study Subjects of patients in the Treatment and Control Groups.

Variable	Group		P value
	Autologous Fibrin Glue	Control	
	N = 20	N = 20	
Age (years)			0.602
Mean $\pm$ std	49.00 $\pm$ 12,118	45.70 $\pm$ 8,151	
Range (min-max)	26.00-84.00	28.00-54.00	
Weight (Kg)			0.779
Mean $\pm$ std	55.80 $\pm$ 8,995	56.25 $\pm$ 7,656	
Range (min-max)	44.00-75.00	44.00-80.00	
Height (m)			0.277
Mean $\pm$ std	1.56 $\pm$ 0.046	1.55 $\pm$ 0.049	
Range (min-max)	1.45-1.65	1.45-1.65	
BMI			0.434
Mean $\pm$ std	22.73 $\pm$ 3.070	23.53 $\pm$ 3.365	
Range (min-max)	18.70-29.30	17.60-33.30	

ARTIKEL PENELITIAN

Chest diameter 0.491
(cm)

Mean $\pm$ std 86.70 $\pm$ 16,986 83.35 $\pm$ 13.244

Range (min-max) 52.00-114.00 55.00-110.00

Note: For numerical data, the p value is tested using unpaired t test if the data is normally distributed with the alternative Mann Whitney test if the data is not normally distributed. Significance value based on p value <0.05 Sign * indicates p value <0.05 means significant or statistically significant.

ARTIKEL PENELITIAN

Table 4.3 Comparison between Laboratory Results research subject in the treatment group and the control group.

Variable	Group		P value
	Treatment N = 20	Control N = 20	
Hemoglobin (g / dL)			0.625
Mean $\pm$ std	11.39 $\pm$ 1,577	11.14 $\pm$ 1,628	
Range (min-max)	8.80-13.90	8.30-13.80	
PT (seconds)			0.060
Median	11.35	12.35	
Range (min-max)	9.80-13.30	10.10-21.10	
APTT (seconds)			0.718
Mean $\pm$ std	27.61 $\pm$ 3,700	28.09 $\pm$ 4,603	
Range (min-max)	20.00-36.00	20.10-41.70	
INR			0.583
Median	0.90	0.90	
Range (min-max)	0.80-1.01	0.83-1.12	

ARTIKEL PENELITIAN

Platelets (105 / uL)			0.165
Median	263.50	238.50	
Range (min-max)	158.00-429.00	103.00-597.00	
Fibrinogen (mg / dL)			0.407
Mean $\pm$ std	399.47 $\pm$ 117,650	375.71 $\pm$ 47.190	
Range (min-max)	151.50-678.00	270.90-496.60	
Albumin (g / dL)			0832
Mean $\pm$ std	3.38 $\pm$ 0.463	3.35 $\pm$ 0.395	
Range (min-max)	2.50-4.00	2.66-4.29	

Note: For numerical data, the p value is tested by using an unpaired t test if the data is normally distributed, with the alternative Mann Whitney test if the data is not normally distributed. Significance value based on p value <0.05 Sign * indicates p value <0.05 means significant or statistically significant.

ARTIKEL PENELITIAN

Table 4.4 Comparison of Seroma Number on day 14 with USG in the Treatment and Control groups.

Variable	Group		P value
	Treatment	Control	
	N = 20	N = 20	
Seroma count (mL) on 14th day by ultrasound			0.005 *
Median	9.30	20.90	
Range (min-max)	0.33-50.30	0.00-40.40	

Note: For numerical data the p value is tested by using unpaired t test if the data is normally distributed with the alternative Mann Whitney test if the data is not normally distributed. The significance value was based on p value <0.05. The * sign indicates a p value <0.05, which means that it is significant or statistically significant.

ARTIKEL PENELITIAN

Evaluasi Spektrum Gelombang USG Doppler dan Kaitannya dengan *Ankle Brachial Index* (ABI) dan Faktor-Faktor Risiko pada pasien *Peripheral Arterial Disease* (PAD)

Patrianef Darwis¹, Faisal Ali Ahmad Kler¹, Karina¹, Rizky Saputra Telaumbanua¹

¹Divisi Vaskular dan Endovaskular, Departemen Bedah, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo

Abstrak

Latar Belakang. Salah satu komplikasi dari *Peripheral Arterial Disease* (PAD) adalah kerusakan tungkai bawah hingga tidak dapat digunakan untuk beraktifitas. Skrining dan penegakan diagnosis lebih awal diharapkan memberikan *outcome* yang lebih baik.

Metode. Penelitian studi potong lintang pada pasien PAD di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dari Juli 2013-Desember 2014. Terdapat 119 pasien yang sesuai dengan kriteria inklusi. Analisis univariat dilakukan untuk memperoleh gambaran distribusi frekuensi masing-masing variabel bebas dan analisis bivariat untuk menilai hubungan antara variabel terikat. Uji Mann Whitney dilakukan untuk menganalisa hubungan antara spektrum gelombang DUS dan ABI pada pasien PAD.

Hasil. Didapatkan pasien PAD dengan nilai ABI rata-rata 0,7 dengan gambaran gelombang DUS yang berubah dari trifasik menjadi non-trifasik dominan pada arteri infrapopliteal. ABI di bawah 0.9 menunjukkan perubahan pada gelombang DUS dari arteri femoralis hingga a.dorsalis pedis dengan nilai $p < 0.05$. Faktor risiko yang signifikan pada PAD adalah usia di atas 45 tahun. Terdapat hubungan signifikan dengan $p < 0,05$ pada hubungan antara gelombang DUS, ABI dan beberapa faktor risiko PAD.

Kesimpulan. Derajat keparahan PAD dapat ditentukan melalui nilai ABI dan DUS. Letak oklusi pada segmen arteri dapat diketahui dengan gelombang DUS. Penilaian ABI dan DUS memiliki hubungan positif terhadap faktor risiko PAD.

Kata kunci: *Peripheral Arterial Disease*, *Ankle Brachial Index*, Spektrum USG Doppler, Faktor-Faktor Risiko PAD (ISSN 2723-7494 J Bedah Indonesia. 2020;48:68-85)

ARTIKEL PENELITIAN

Korespondensi penulis:

Patrianef Darwis

Divisi Bedah Vaskular dan Endovaskular. Departemen Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo

email : patrianef@gmail.com

ORCID ID

<https://orcid.org/0000-0002-4982-9034>

ARTIKEL PENELITIAN

Pendahuluan

Peripheral Arterial Disease (PAD) merupakan suatu kelainan progresif yang menjadi penyebab paling sering hilangnya kemampuan untuk berjalan akibat iskemia tungkai kronis.¹ Berdasarkan *Guideline* PAD 2019 diketahui bahwa ada sekitar > 202 juta orang yang menderita PAD di dunia.² Jun Shu (2018) mengatakan populasi yang berisiko tinggi menderita PAD adalah yang berusia lanjut, dengan prevalensi 29% pada kelompok individu usia > 70 tahun tanpa faktor risiko lain atau 50-69 tahun dengan riwayat merokok atau diabetes melitus.³

Prosedur diagnostik efektif dan teknologi yang memiliki nilai prognostik sangat diperlukan dalam upaya deteksi dini dan pengobatan untuk menghindari komplikasi dan intervensi. Para ahli saat ini menggunakan kombinasi dari *ankle-brachial Index* (ABI) dan analisis gelombang *Doppler Ultrasonography* (DUS).⁴ ABI merupakan alat skrining *non-invasive non-imaging* yang paling baik untuk mengevaluasi keberadaan penyakit arterial pada ekstremitas bawah.^{5,6} ABI ≤ 0.9 merupakan penilaian awal untuk menegakkan diagnosis PAD.^{2,5,6} DUS

merupakan alat yang non-invasif untuk visualisasi arterial di ekstremitas bawah.^{7,8}

Metode

Penelitian ini bersifat potong lintang yang dilakukan pada April – Juli 2015 di Divisi Bedah Vaskular Departemen Ilmu Bedah FKUI-RSCM, Jakarta. Populasi pada penelitian ini adalah semua pasien yang terdiagnosis PAD dan telah dilakukan pemeriksaan Doppler USG di Divisi Bedah Vaskular RSCM pada kurun waktu Juli 2013 sampai Desember 2014.

Pengambilan sampel dilakukan dengan konsekutif yaitu menggunakan seluruh pasien yang terdata dalam data rekam medis Divisi Bedah Vaskular yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah pasien PAD yang berobat ke Divisi Vaskular dan Endovaskular Departemen Ilmu Bedah FKUI-RSCM periode Juli 2013 sampai Desember 2014, menjalani pemeriksaan Doppler USG, ABI ≤ 0.9 , dengan kriteria eksklusi PAD Non-Atherosklerotik seperti disebabkan oleh Vaskulitis dan *Buerger Disease*. Variabel

ARTIKEL PENELITIAN

bebas dalam penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, merokok, hipertensi, hiperlipidemia, diabetes melitus, riwayat CAD dan CVD. Variabel terikat adalah pasien PAD yang menjalani Doppler USG dengan $ABI \leq 0,9$. Data yang telah dikumpulkan melalui pengumpulan data sekunder dilakukan verifikasi dan diolah menggunakan program statistik SPSS *ver 20.0 for windows*. Uji analitik yang dilakukan adalah Uji Man Whitney untuk menilai hubungan antara ABI dan faktor risiko pada pasien PAD, dan Uji statistik yang dilakukan adalah Uji *Chi Square* untuk menilai hubungan antara spektrum gelombang DUS dengan faktor risiko PAD. Penelitian ini telah disetujui Komisi Etik Penelitian FKUI nomor 464/UN2.F1/ETIK/PPM.00.02/2019.

Hasil

Data diambil dari bulan Juli 2013 hingga bulan Desember 2014 dan diperoleh sebanyak 199 pasien dengan PAD. Sebanyak 80 data pasien tidak dapat dianalisis karena tidak termasuk kriteria inklusi dan data yang tidak lengkap. 119 pasien yang diperoleh data sesuai dengan nilai tertingginya 0,9. Sedangkan untuk segmen arteri poplitea, didapatkan gelombang monofasik dengan nilai median

penelitian ini. Data diperoleh dengan cara pengambilan data melalui rekam medis dengan pemeriksaan ABI menggunakan *handheld Doppler* dilanjutkan pemeriksaan menggunakan DUS pada sampel pasien PAD Divisi Bedah Vaskular dan Endovaskular di RSCM.

Karakteristik Spektrum Gelombang USG Doppler pada pasien PAD

Pada (**tabel 1**), gambaran spektrum DUS berupa gelombang trifasik, bifasik dan monofasik di segmen arteri femoralis pada 119 pasien PAD, dengan gambaran gelombang trifasik sebanyak 73 pasien yaitu 61,3%, gambaran gelombang bifasik sebanyak 46 pasien yaitu 38,7% dan tidak ada pasien dengan gambaran gelombang monofasik.

Hubungan antara ABI dan Spektrum USG Doppler

Pada (**tabel 3**) terdapat hubungan signifikan antara ABI dan spektrum gelombang DUS pada semua segmen dari arteri femoralis hingga arteri dorsalis pedis dengan $p < 0,05$. Pada arteri femoralis didapatkan gelombang bifasik dengan nilai ABI 0,60 dimana nilai terendahnya 0,4 dan ABI 0,6. Pada arteri tibialis posterior, gelombang monofasik tampak pada nilai median ABI 0,7, nilai terendahnya 0,5 dan

ARTIKEL PENELITIAN

tertingginya 0,9. dan pada arteri dorsalis pedis, gelombang monofasik juga tampak pada nilai median ABI 0,7 dengan nilai terendahnya 0,4 dan tertinggi 0,9.

Hubungan antara ABI dan Faktor-faktor Risiko pada pasien PAD

Pada (tabel 4) ditemukan variabel usia, hiperlipidemia dan DM mempunyai nilai p yang signifikan. Terlihat bahwa adanya hubungan signifikan antara peningkatan usia dengan penurunan nilai ABI. Usia ≥ 45 th mempunyai nilai median ABI 0,7 dengan nilai $p = 0,001$ ($p < 0,05$). Sementara itu, tidak terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin, merokok, hipertensi, riwayat CAD dan CVD dengan nilai ABI ($p > 0,05$). Pada kasus hiperlipidemia (peningkatan kadar LDL darah), penurunan ABI $\leq 0,9$ mempunyai hubungan signifikan dengan peningkatan LDL darah dengan nilai $p = 0,010$ ($p < 0,05$). Pada pasien diabetes melitus secara statistik juga memiliki hubungan signifikan antara penurunan nilai ABI dengan penyakit diabetes melitus yaitu dengan nilai $p = 0,037$ ($p < 0,05$). Pada pasien diabetes melitus nilai rata-rata ABI 0,69 dengan nilai terendah 0,4 dan tertinggi 0,87. Sedangkan yang tidak mengalami diabetes melitus mempunyai nilai median ABI 0,73

dengan nilai terendah 0,6 dan tertinggi 0,9.

Hubungan antara Spektrum USG Doppler dengan Faktor-faktor risiko

Pada (tabel 5) terlihat hubungan antara spektrum gelombang DUS pada segmen arteri femoralis hingga arteri dorsalis pedis dengan faktor-faktor risiko hanya terdapat hubungan signifikan antara usia di atas 45 tahun dengan gelombang DUS yaitu $p < 0,05$.

Pada (tabel 6), tampak pada arteri poplitea terdapat jumlah pasien yang banyak dengan gelombang bifasik yang mempunyai usia diatas 45 tahun yaitu 80 pasien atau 76,9% dan nilai $p = 0,013$ ($p < 0,05$). Pasien PAD dengan gambaran gelombang bifasik di arteri poplitea mempunyai faktor risiko berupa hipertensi 59 pasien (75,6%), hiperlipidemia 65 pasien (76,5%), diabetes melitus 65 pasien (76,5%) tetapi tidak bermakna secara statistik.

Pada (tabel 7), tampak pada arteri tibialis posterior terdapat gambaran gelombang monofasik pada 57 pasien (54,8%) dengan usia diatas 45 tahun yang secara statistik bermakna dengan nilai $p = 0,033$ ($p < 0,05$). Sedangkan pada faktor-faktor risiko yang lain tidak terdapat perbedaan dari segi jumlah pasien dan

ARTIKEL PENELITIAN

presentasinya dan juga tidak terdapat hubungan signifikan antara perubahan gambaran gelombang DUS dengan faktor-faktor risiko. Pada tabel 8 tampak pada arteri dorsalis pedis gambaran gelombang monofasik lebih dominan pada 89 pasien (85,6%) dengan nilai $p=0,026$ pada pasien PAD di atas usia 45 tahun. Juga tampak peningkatan gambaran gelombang monofasik dengan hipertensi 63 pasien (80,8%), hiperlipidemia 73 pasien (85,9%) dan diabetes melitus 69 pasien (81,2%) tetapi secara statistik tidak menunjukkan hubungan signifikan antara perubahan gelombang DUS dengan faktor-faktor risiko tersebut.

Diskusi

Karakteristik faktor-faktor risiko pada pasien PAD

Pada pasien PAD ditemukan usia median adalah 59 tahun. Hal ini sesuai dengan *guideline* PAD tahun 2016, dimana usia tua merupakan faktor risiko PAD.⁹ Berdasarkan jenis kelamin tidak ada perbedaan perbandingan antara laki-laki dan perempuan yaitu pada laki-laki terdapat 60 pasien atau 50,4% sedangkan untuk perempuan sebanyak 59 pasien atau 49,8%. Perbandingan antara perempuan : laki-laki adalah 1:1. Hal ini sesuai dengan penelitian

Kunihiro M dkk (2019) yang menyatakan perempuan memiliki risiko PAD yang sama dengan laki – laki baik berdasarkan kelompok ras / etnisnya.¹⁰ Secara karakteristik pasien merokok sebanyak 53,8%. Jumlah pasien dengan hipertensi, peningkatan LDL darah dan diabetes melitus dengan PAD mempunyai presentase tinggi yaitu 65,5%, 71,4% dan 71,4% masing-masing. Faktor-faktor risiko tersebut meningkatkan kejadian PAD lebih besar sesuai dengan alur patogenesis atherosklerosis. Sedangkan pasien dengan riwayat CAD dan CVD mempunyai persentase dibawah 50%. Hasil diatas konsisten berdasar beberapa studi sebelumnya.^{6,10,11,12}

Hubungan antara ABI dan faktor-faktor risiko pada pasien PAD

Berdasarkan karakteristik nilai ABI pada pasien PAD didapatkan rerata sebesar 0,7 dengan nilai terendah adalah 0,4 terdapat pada satu pasien dan tertinggi adalah 0,9. Data ini sesuai dengan kriteria diagnosis PAD berdasarkan ABI, bahwa penilaian awal PAD adalah dengan pemeriksaan $ABI \leq 0,9$.^{2,5,6}

Pada penelitian ini ditemukan bahwa dengan meningkatnya usia ≥ 45 th maka juga terjadi penurunan nilai $ABI \leq 0,9$ dan

ARTIKEL PENELITIAN

secara statistik terdapat hubungan signifikan dengan nilai $p < 0,05$. hal ini sesuai dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa usia tua merupakan populasi dengan risiko tinggi menderita PAD.^{2,3,10} Peningkatan LDL darah juga mempunyai hubungan signifikan dengan penurunan nilai ABI $\leq 0,9$ dengan nilai $p < 0,05$ dan banyaknya pasien dengan peningkatan kadar LDL darah yang mempunyai ABI yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian kohort Kunihiro M (2019), riwayat penyakit jantung koroner, stroke dan faktor risiko tradisional (merokok, dislipidemia) memiliki angka prevalensi yang tinggi pada PAD.¹⁰

Pada faktor risiko diabetes melitus juga ditemukan hubungan signifikan dengan penurunan nilai ABI yaitu $p < 0,05$ dan pasien PAD yang juga mempunyai diabetes terdapat nilai ABI yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian L. Potier dkk (2011) yang menyatakan bahwa pengukuran ABI adalah metode yang mudah dan terbukti efisien dalam mendiagnosis PAD dengan faktor risiko kardiovaskular dan diabetes.^{6, 13} Insidensi PAD pada diabetes 2 sampai 4 kali lipat lebih tinggi.¹⁴ Pasien diabetes dengan PAD seringkali terjadi sumbatan

pada infrapopliteal dan adanya kalsifikasi vaskular.¹³ PAD pada diabetes berbeda dengan PAD yang disebabkan oleh rokok. Arteriopati pada pasien diabetes meliputi arteri-arteri distal lebih banyak daripada di proksimal. Pembuluh darah yang sering terkena adalah arteri poplitea, trunkus anterior tibioperoneal, tibialis posterior dan dorsalis pedis.¹³

Hubungan antara Spektrum Gelombang DUS dan faktor-faktor risiko pada pasien PAD

Dari 119 pasien PAD didapatkan hasil perubahan gelombang DUS dari trifasik ke monofasik sesuai dengan urutan segmen arteri yaitu dari arteri femoralis, arteri poplitea, arteri tibialis posterior dan arteri dorsalis pedis. Gambaran didukung oleh penelitian Samia, dkk (2018), DUS memperlihatkan gambaran vaskular dan kecepatan aliran dan merupakan metode yang akurat untuk menentukan lokasi dan derajat keparahan PAD pada ekstremitas bawah dengan sensitivitas dan spesifitas diatas 90%. Verim dkk (2013) menyatakan sensitivitas DUS menurun pada bagian distal yaitu di arteri tibialis posterior dan arteri dorsalis pedis pada suatu penelitian yang mengevaluasi 24 pasien dan 213 segmen arteri.¹⁵ Bergamini dkk meneliti 404 segmen arteri dan menemukan 86%

ARTIKEL PENELITIAN

ketepatan pada segmen arteri femoralis, 47% pada segmen arteri poplitea, dan 25% pada arteri tibialis posterior dan arteri dorsalis pedis.¹⁶

Pada segmen arteri femoralis hingga arteri dorsalis pedis terdapat hubungan signifikan antara peningkatan usia diatas 45 tahun dengan spektrum gelombang DUS yaitu nilai $p < 0,05$.

Meski tidak terdapat hubungan antara faktor-faktor risiko lain dengan gelombang DUS di arteri femoralis hingga arteri dorsalis pedis tetapi dari segi persentase perubahan gelombang DUS menjadi bifasik dan monofasik yang tinggi menunjukkan bahwa aliran darah ke perifer berkurang secara nyata. Pada arteri poplitea persentase gelombang bifasik pada semua faktor risiko diatas 50%, Begitu pula di arteri tibialis posterior dimana faktor risiko seperti hipertensi, hiperlipidemia, riwayat CAD dan CVD memberi gambaran gelombang monofasik yang tinggi diatas 50% sedang untuk merokok terdapat gambaran bifasik diatas 51,6%. Pada arteri dorsalis pedis bahkan seluruh faktor risiko menunjukkan persentase yang tinggi diatas 80% gelombang monofasik Hal ini memang secara statistik tidak signifikan tapi dari data klinis dapat dilihat bahwa faktor-faktor risiko menunjukkan peran

penting dalam pembentukan atherosklerosis dan terjadinya PAD.

Hubungan antara ABI dan Spektrum Gelombang DUS pada pasien PAD

Pada segmen arteri femoralis hingga arteri dorsalis pedis dilakukan pengujian dengan Uji Mann Whitney dan didapatkan hasil yang signifikan antara penurunan nilai ABI $\leq 0,9$ dengan perubahan spektrum gelombang DUS dengan nilai $p < 0,05$. Hal ini menunjukkan aliran darah yang menurun dengan nilai ABI dibawah 0,9 dan juga dapat dideteksi dengan perubahan gelombang pada DUS. Hal ini sesuai dengan teori bahwa dengan semakin menyempitnya lumen arteri oleh karena berbagai sebab maka aliran ke distal lebih kecil hingga tampak pada spektrum gelombang DUS adanya perubahan gelombang yang pada ABI yang rendah dari bifasik menjadi monofasik. Makin rendah ABI maka makin kecil aliran darah ke distal dan tampak perubahan gelombang DUS kearah perburukan.¹⁵ Pada arteri femoralis didapatkan jumlah trifasik yang lebih banyak dibandingkan dengan gelombang bifasik tetapi masih tetap signifikan secara statistik antara hubungan penurunan nilai ABI $\leq 0,9$ dengan spektrum gelombang DUS ini dikarenakan bahwa nilai ABI yang lebih rendah terdapat pada

ARTIKEL PENELITIAN

arteri femoralis menunjukkan gambaran bifasik, dan makin rendah nilai ABI maka makin signifikan dengan perubahan gelombang DUS.¹⁵

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu jumlah sampel yang tidak cukup besar, subjek pada penelitian ini mungkin tidak bisa merepresentasikan populasi umum karena sampel diambil hanya dari satu Rumah Sakit Pendidikan, dan pengumpulan serta interpretasi dari hasil USG Doppler bergantung pada keahlian operator. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dalam hal mendiagnosis dan mencegah PAD, harus direncanakan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang jauh lebih besar.

Kesimpulan

Derajat keparahan PAD dapat ditentukan melalui nilai ABI dan DUS. Letak oklusi pada segmen arteri dapat diketahui dengan gelombang DUS. Penilaian ABI dan DUS memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap faktor risiko usia, dm dan dislipidemia pada pasien PAD.

Daftar Pustaka

1. Nehler MR, Duval S, Diao L, Annex BH, Hiatt WR, Rogers K, et al. Epidemiology of peripheral arterial disease and critical limb ischemia in an insured national population. *Journal of vascular surgery*. 2014;60(3):686-95. e2.
2. Frank U, Nikol S, Belch J, Boc V, Brodmann M, Carpentier PH, et al. ESVM Guideline on peripheral arterial disease. *Vasa*. 2019;48(Suppl 102):1-79.
3. Shu J, Santulli G. Update on peripheral artery disease: epidemiology and evidence-based facts. *Atherosclerosis*. 2018;275:379-81.
4. Chin JA, Wang EC, Kibbe MR. Evaluation of hyperspectral technology for assessing the presence and severity of peripheral artery disease. *Journal of vascular surgery*. 2011;54(6):1679-88.
5. Gupta A, Tyagi VK, Bansal N, Virmani S, Sirohi T. Comparison of ankle brachial pressure index to arterial doppler USG in the diagnosis of peripheral vascular

ARTIKEL PENELITIAN

- disease in diabetes mellitus. *International Journal of Advances in Medicine*. 2017;4(6):1562.
6. Marius R-A, Iliuta L, Guberna SM, Sinescu C. The role of ankle-brachial index for predicting peripheral arterial disease. *Maedica*. 2014;9(3):295.
7. Deane C. Ultrasound in Peripheral Arterial Disease. EFSUMB Course Book on Ultrasound: Latimer Trend & Company Ltd; 2012.
8. Natha B. Screening for peripheral arterial disease. *SAMJ: South African Medical Journal*. 2014;104(2):149-.
9. Morcos R, Louka B, Tseng A, Misra S, McBane R, Esser H, et al. The evolving treatment of peripheral arterial disease through guideline-directed recommendations. *Journal of Clinical Medicine*. 2018;7(1):9.
10. Matsushita K, Sang Y, Ning H, Ballew SH, Chow EK, Grams ME, et al. Lifetime Risk of Lower-Extremity Peripheral Artery Disease Defined by Ankle-Brachial Index in the United States. *Journal of the American Heart Association*. 2019;8(18):e012177.
11. Ogata H, Kumata-Maeta C, Shishido K, Mizobuchi M, Yamamoto M, Koiwa F, et al. Detection of peripheral artery disease by duplex ultrasonography among hemodialysis patients. *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*. 2010;5(12):2199-206.
12. Subramaniam T, Nang EEK, Lim SC, Wu Y, Khoo CM, Lee J, et al. Distribution of ankle—brachial index and the risk factors of peripheral artery disease in a multi-ethnic Asian population. *Vascular medicine*. 2011;16(2):87-95.
13. Potier L, Abi Khalil C, Mohammedi K, Roussel R. Use and utility of ankle brachial index in patients with diabetes. *European Journal of Vascular and Endovascular Surgery*. 2011;41(1):110-6.
14. Balletshofer B, Ito W, Lawall H, Malyar N, Oberländer Y, Reimer P, et al. Position paper on the diagnosis and treatment of peripheral arterial disease (PAD) in people with diabetes mellitus. *Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes*. 2019;127(S 01):S105-S13.

ARTIKEL PENELITIAN

15. Verim S, Taşçı İ. Doppler ultrasonography in lower extremity peripheral arterial disease. Arch Turk Soc Cardiol. 2013;41(3):248-55.
16. Bergamini TM, Tatum Jr CM, Marshall C, Hall-Disselkamp B, Richardson JD. Effect of multilevel sequential stenosis on lower extremity arterial duplex scanning. The American journal of surgery. 1995;169(6):564-6.

ARTIKEL PENELITIAN

Daftar Tabel

Tabel 1. Karakteristik Spektrum Gelombang USG Doppler pada pasien PAD

Variabel		n	%
Gelombang A.Femoralis	Trifasik	73	61,30%
	Bifasik	46	38,70%
	Monofasik	0	0%
Gelombang A..Poplitea	Trifasik	28	23,50%
	Bifasik	87	73,10%
	Monofasik	4	3,40%
Gelombang A.Tibialis Posterior	Trifasik	3	2,50%
	Bifasik	56	47,10%
	Monofasik	60	50,40%
Gelombang A.Dorsalis Pedis	Trifasik	0	0%
	Bifasik	21	17,60%
	Monofasik	98	82,40%

Tabel 2. Karakteristik ABI dan Distribusi Usia pada pasien PAD

Variabel	Median (Min - Max)
Usia	59 (30 – 81)
ABI	0.7 (0,4 – 0,9)

ARTIKEL PENELITIAN

Tabel 3. Hubungan antara ABI dan Spektrum USG Doppler

Variabel	ABI	P
A. Femoralis		
Trifasik	0,76 (0,6 – 0,9)	< 0,001
Bifasik	0,6 (0,4 – 0,9)	
Monofasik	-	
A. Poplitea		
Trifasik	0,8 (0,6 – 0,9)	<0,001
Bifasik	0,7 (0,4 – 0,9)	
Monofasik	0,6 (0,6 – 0,6)	
A. Tibialis Posterior		
Trifasik	0,8 (0,7 – 0,9)	0,002
Bifasik	0,78 (0,4 – 0,9)	
Monofasik	0,7 (0,5 – 0,9)	
A. Dorsalis Pedis		
Trifasik	-	0,005
Bifasik	0,8 (0,6 – 0,9)	
Monofasik	0,7 (0,4 – 0,9)	

ARTIKEL PENELITIAN

Tabel 4. Hubungan antara ABI dan Faktor-faktor Risiko pada pasien PAD

Variabel		ABI	p
Usia	≥45th	0,7 (0,4-0,9)	<0,001
	≤45th	0,8 (0,6-0,9)	
Jenis Kelamin	Laki-laki	0,7 (0,4-0,9)	0,909
	Perempuan	0,7 (0,5-0,9)	
Merokok	Ya	0,7 (0,4-0,9)	0,734
	Tidak	0,7 (0,5-0,9)	
Hipertensi	Ya	0,69 (0,4-0,9)	0,169
	Tidak	0,72 (0,5-0,9)	
Hiperlipidemia	Ya	0,69 (0,4-0,9)	0,010
	Tidak	0,74 (0,6-0,9)	
Diabetes Melitus	Ya	0,69 (0,4-0,87)	0,037
	Tidak	0,73 (0,5-0,9)	
Riwayat CAD	Ya	0,69 (0,4-0,87)	0,753
	Tidak	0,71 (0,5-0,9)	
Riwayat CVD	Ya	0,68 (0,4-0,86)	0,234
	Tidak	0,71 (0,5-0,9)	

ARTIKEL PENELITIAN

Tabel 5. Hubungan antara Spektrum USG Doppler Arteri Femoralis dengan Faktor-faktor risiko

Variabel		Arteri Femoralis			P
		Trifasik	Bifasik	Monofasik	
Usia	≥45th	59 (56,7%)	45 (43,3%)	0 (0%)	0,006
	≤45th	14 (93,3%)	1 (6,7%)	0 (0%)	
Jenis Kelamin	Laki-laki	38 (63,3%)	22 (36,7%)	0 (0%)	0,653
	Perempuan	35 (59,3%)	24 (40,7%)	0 (0%)	
Merokok	Ya	39 (60,9%)	25 (39,1%)	0 (0%)	0,992
	Tidak	34 (61,8%)	21 (38,2%)	0 (0%)	
Hipertensi	Ya	45 (57,7%)	33 (42,3%)	0 (0%)	0,259
	Tidak	28 (68,3%)	13 (31,7%)	0 (0%)	
Hiperlipidemia	Ya	51 (60%)	34 (40%)	0 (0%)	0,634
	Tidak	22 (64,7%)	12 (35,3%)	0 (0%)	
Diabetes Melitus	Ya	49 (57,6%)	36 (42,4%)	0 (0%)	0,190
	Tidak	24 (70,6%)	10 (29,4%)	0 (0%)	
Riwayat CAD	Ya	26 (61,9%)	16 (38,1%)	0 (0%)	0,926
	Tidak	47 (61%)	30 (39%)	0 (0%)	
Riwayat CVD	Ya	18 (60%)	12 (40%)	0 (0%)	0,861
	Tidak	55 (61,8%)	34 (38,2%)	0 (0%)	

ARTIKEL PENELITIAN

Tabel 6. Hubungan antara Spektrum USG Doppler Arteri Poplitea dengan Faktor-faktor risiko

Variabel	Arteri Poplitea				P
		Trifasik	Bifasik	Monofasik	
Usia	≥45th	20 (19,2%)	80 (76,9%)	4 (3,8%)	0,013
	≤45th	8 (53,3%)	7 (46,7%)	0 (0%)	
Jenis Kelamin	Laki-laki	17 (28,3%)	42 (70%)	1 (1,7%)	0,304
	Perempuan	11 (18,6%)	45 (76,3%)	3 (5,1%)	
Merokok	Ya	18 (28,1%)	45 (70,3%)	1 (1,6%)	0,356
	Tidak	10 (18,2%)	42 (76,4%)	3 (5,5%)	
Hipertensi	Ya	17 (21,8%)	59 (75,6%)	2 (2,6%)	0,633
	Tidak	11 (26,8%)	28 (68,3%)	2 (4,9%)	
Hiperlipidemia	Ya	17 (20%)	65 (76,5%)	3 (3,5%)	0,357
	Tidak	11 (32,4%)	22 (64,7%)	1 (2,9%)	
Diabetes Melitus	Ya	17 (20%)	65 (76,5%)	3 (3,5%)	0,357
	Tidak	11 (32,4%)	22 (64,7%)	1 (2,9%)	
Riwayat CAD	Ya	8 (19%)	33 (78,6%)	1 (2,4%)	0,605
	Tidak	20 (26%)	54 (70,1%)	3 (3,9%)	
Riwayat CVD	Ya	4 (27%)	26 (86,7%)	0 (0%)	0,137
	Tidak	24 (27%)	61 (68,5%)	4 (4,5%)	

ARTIKEL PENELITIAN

Tabel 7. Hubungan antara Spektrum USG Doppler Arteri Tibialis Posterior dengan Faktor-faktor risiko

Variabel	Arteri Tibialis Posterior				P
		Trifasik	Bifasik	Monofasik	
Usia	≥45th	2 (1,9%)	45 (43,3%)	57 (54,8%)	0,033
	≤45th	1 (6,7%)	11 (73,3%)	3 (20%)	
Jenis Kelamin	Laki-laki	2 (3,3%)	30 (50%)	28 (46,7%)	0,645
	Perempuan	1 (1,7%)	26 (44,1%)	32 (54,2%)	
Merokok	Ya	2 (3,1%)	35 (51,6%)	29 (45,3%)	0,469
	Tidak	1 (1,8%)	23 (41,8%)	31 (56,4%)	
Hipertensi	Ya	1 (1,3%)	37 (47,4%)	40 (55,3%)	0,492
	Tidak	2 (4,9%)	19 (46,3%)	20 (48,8%)	
Hiperlipidemia	Ya	2 (2,4%)	36 (42,4%)	47 (55,3%)	0,242
	Tidak	1 (2,9%)	20 (58,8%)	13 (38,2%)	
Diabetes Melitus	Ya	2 (2,4%)	42 (49,4%)	41 (48,2%)	0,717
	Tidak	1 (2,9%)	14 (41,2%)	19 (55,9%)	
Riwayat CAD	Ya	2 (4,8%)	16 (38,1%)	24 (57,1%)	0,225
	Tidak	1 (1,3%)	40 (51,9%)	36 (46,8%)	
Riwayat CVD	Ya	0 (0%)	14 (46,7%)	16 (53,3%)	0,583
	Tidak	3 (3,4%)	42 (47,2%)	44 (49,4%)	

ARTIKEL PENELITIAN

Tabel 8. Hubungan antara Spektrum USG Doppler Arteri Dorsalis Pedis dengan Faktor-faktor risiko

Variabel		Arteri Dorsalis Pedis			P
		Trifasik	Bifasik	Monofasik	
Usia	≥45th	0 (0%)	89 (85,6%)	57 (54,8%)	0,026
	≤45th	0 (0%)	9 (60%)	3 (20%)	
Jenis Kelamin	Laki-laki	0 (0%)	11 (18,3%)	49 (81,7%)	0,843
	Perempuan	0 (0%)	10 (16,9%)	49 (83,1%)	
Merokok	Ya	0 (0%)	12 (18,8%)	52 (81,3%)	0,743
	Tidak	0 (0%)	9 (16,4%)	46 (83,6%)	
Hipertensi	Ya	0 (0%)	15 (19,2%)	63 (80,8%)	0,532
	Tidak	0 (0%)	6 (14,6%)	35 (85,4%)	
Hiperlipidemia	Ya	0 (0%)	12 (14,1%)	73 (85,9%)	0,110
	Tidak	0 (0%)	9 (26,5%)	25 (73,5%)	
Diabetes Melitus	Ya	0 (0%)	16 (18,8%)	69 (81,2%)	0,595
	Tidak	0 (0%)	5 (14,7%)	29 (85,3%)	
Riwayat CAD	Ya	0 (0%)	6 (14,3%)	36 (85,7%)	0,477
	Tidak	0 (0%)	15 (19,5%)	62 (80,5%)	
Riwayat CVD	Ya	0 (0%)	2 (6,7%)	28 (93,3%)	0,068
	Tidak	0 (0%)	19 (21,3%)	70 (78,7%)	

Jurnal Ilmu Bedah Indonesia

Rukan Mitra Matraman

Blok A1 No 18 – Lantai 2

Jl. Matraman Raya 148

Jakarta Timur

Indonesia

Phone : 081317727640

Email: jurnalilmubedahindonesia@yahoo.com

Journal DOI: <https://doi.org/10.46800/ilmbed>

eISSN 2723-7494.